

**SCHEMA DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU SUSTINEREA CORPULUI FUMATORILOR ADULTI SI COPII CU VARSTA DE PESTE 12 ANI CARE NU AU VOINTA NECESARA SA RENUNTE LA FUMATUL ACTIV**

Romanian version (rv) 1.0 (rv1.0 launched on 5.12.2019); latest version always available at this [URL](#);

DOI: [10.13140/RG.2.2.18126.20808](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18126.20808)

**Dr. Andrei-Lucian Drăgoi ([www.dragoii.com](http://www.dragoii.com), [dr.dragoi@yahoo.com](mailto:dr.dragoi@yahoo.com)), medic specialist pediatru, cercetator, compozitor, editor si publicist independent**

\*

**Dedication.** Cu multumiri pentru provocarea si motivarea de a scrie acest articol doamnei asistente Monica Tichie din **Sectia de recuperare neuromotorie copii** din Gura Ocnitei (Adanca) a **Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste (SJUT)**.

**Motto:** "NU-ti poti iubi aproapele ca pe tine insuti daca NU stii sa te iubesti in primul rand pe sine: ca sa demonstrezi iubirea de sine, trebuie sa stii sa iti pretuiesti sufletul, mintea si trupul, hrانind si protejand corespunzator celulele trupului care este palatul sufletului si al mintii!" (dr. Andrei-Lucian Drăgoi, 5.12.2019)

\*\*

**SCHEMA PT FUMATORII ACTIVI INTRE PUSEELE DE TUSE (schema de baza) PENTRU ADULTI SI COPIII CU VARSTA PESTE 12 ANI:**

1. **Un supliment alimentar oral cu acizi grasi omega-3 (AGO3) precum Omega-3 extra** (ulei de peste encapsulat produs de firma germana Doppel Hertz) cps 1000mg (1g): 1+1+0cps/zi (dupa mese), cu exceptia celor alergici la peste si deriveate din peste, crustacee sau alte "fructe" de mare (risc de alergie incrusata). In caz de menstruatie (unde este cazul), se va intrerupe cu 2-3 zile inainte de menstruatie/interventii chirurgicale (sau alte interventii potential sangerande) SI se va relua la 2 zile dupa oprirea sangerarilor menstruale (dat fiind ca AGO3 poate avea un efect anticoagulant similar aspirinei, implicit pot favoriza sangerarile menstruale, acestea devenind mai mari cantitativ).

- a. **NOTA IMPORTANTA.** In timpul menstrelor (unde este cazul) se va sustine corpul cu un **preparat oral de fier** (de exemplu Tot'hema 1 fiola/zi sau Altrifer cps 30mg, 1cps/zi) PLUS un preparat oral de Calciu+vitamina D3+vitamina K (Calcidin plicuri, ½-1 plic/zi) PLUS un **antiinflamator nesteroidian** de preferat intrarectal (AINS, de exemplu Clafen [diclofenac] sup 100mg, ½-3/4-1sup/zi [cu exceptia celor alergici] DOAR in primele 1-2 zile de menstruatie, cand durerile pelvine sunt mai accentuate, CU ACEA CONDITIE INSA de a nu avea istoric de ulcer si gastrita in ultimii 5 ani, de hemoroizi in ultimul an SI de a se folosi initial o doza mica de Clafen de ½-3/4 sup/zi DUPA MESE, chiar daca se administreaza intrarectal). **NOTA BENE (1).** TOATE aceste suplimente si medicamente se vor folosi STRICT in TOATE zilele menstruale (cu exceptie AINS [Clafen] care se va administra doar in primele 1-2 zile de menstra). **NOTA BENE (2).** In cazul in care se va observa o crestere a apetitului alimentar (posibil produsa de suplimentele alimentare enumerate in acest paragraf), se vor prefera gustari scurte de legume intre mese (rosii, castraveti, gogosari etc).

2. **Un agent expectorant, mucolitic (fluidizant secreti)** precum Ambroxol cp 30mg (alternativa mai ieftina) SAU Erdomed cp 300mg (alternativa mai scumpa, 1 cp/zi la fiecare 1-2 zile [cu exceptia celor alergici] (daca se va alege administrarea la fiecare 2 zile, se vor alege doar zilele cu sot sau fara sot, pentru a se si face o comparatie de stare clinica intre zilele in care s-a primit si agent expectorant, fata de cele in care NU s-a primit si expectorant).

3. **Un agent indulcitor natural ca Stevia Rebaudiana (SR) solutie** [cu exceptia celor alergici] (produsa dintr-o planta indiana cu un gust mult mai dulce decat zaharul pe aceeasi unitate masica, dar mult mai putine calorii pe aceeasi unitate masica) 1-2-3 picaturi x 1-2-3-4-5-6/zi oral (de tinut cat mai mult acele picaturi in cavitatea orala) de fiecare data cand pacientul simte nevoia de tigara: aceasta solutie dulce stimuleaza secretia si eliberarea de endorfine in creier, endorfine care dau stare de bine si scad nevoia subiectiva si dependenta psihologica de tigara.

- a. **NOTA IMPORTANTA.** Daca solutia de SR NU va functiona in scaderea numarului de tigari fumate zilnic (NTZ), se va incerca inlocuirea cel putin a unei parti din NTZ cu folosirea unui sistem de fumat electronic care incinge tutunul pana la circa 250-300 de grade Celsius (FARA sa il combustioneze insa!) SAU se va inlocui o parte din NTZ cu folosirea de plasturi nicotinici sau spray cu nicotine.

4. **OPTIONAL.** Un agent expectorant/fluidizant in aerosoli/nebulizat precum Respisun (=solutie salina 3%) 2ml+(2-3)ml ser fiziologic (SF)=4-5ml solutie salina diluata (cu concentratie rezultanta de cca 2%) x 1/zi seara in aerosoli (folosind aparat de aerosoli/nebulizator cu compresor sau ultrasunete din comert).
5. **OPTIONAL.** Un agent antioxidant vitaminic precum Vitamina C cp 180mg, 1cp/zi la fiecare 2 zile (in zilele cu sot/fara sot in care pacientul NU primeste agentul expectorant [Ambroxol sau Erdomed])

**SCHEMA PT FUMATORII ACTIVI IN PUSEELE DE TUSE (tuse prin infectii/intercurente respiratorii, BPOC, etc) (bazata pe schema de baza) pentru ADULTI SI COPIII CU VARSTA PESTE 12 ANI:**

1. **Se va creste doza de supliment cu AGO3:** Omega-3 extra cps 1g la 1+1+1cps/zi (dupa mese) (pe toata perioada tusei).
2. **Se va creste doza de agent expectorant:** Ambroxol 1cp x 2-3/zi (1+1+0cps/zi sau 1+1+1cp/zi) (dupa mese) SAU Erdomed 1 cp x 2/zi (pe toata perioada tusei)
3. **Se va creste doza de agent indulcitor natural (SR):** in ideea de a sista partial sau total (cel putin temporar) consumul de tigari (pe toata perioada tusei).
4. **Se va creste doza de antioxidant vitaminic:** Vitamina C cp 180mg, 1 cp/zi zilnic (pe toata perioada tusei).
5. **Optional.** Un supliment alimentar cu zinc precum Zinkit cp 10mg efervescente, 1cp/zi (cu cel putin 200ml per cp) zilnic (pe toata perioada tusei).
6. **Optional.** Se va creste frecventa aerosoli cu solutie salina diluata 2% la o frecventa de: 1 sedinta x 2-3/zi (pe toata perioada tusei).
7. **NOTA BENE.** Pacientii care au boli de fond precum astm bronsic, BPOC, emfizem etc TREBUIE sa consulte medicul currant in caz de infectii respiratorii sau decompensari ale bolii de baza.