

Demostración de la Conjetura de los Primos Gemelos

Autor: Ramón Ruiz

Mayo 2014

Resumen.

Enunciado de la Conjetura de los Primos Gemelos: “Existe un número infinito de primos p tales que $p + 2$ también es primo”.

Inicialmente, para demostrar esta conjetura se pueden formar dos sucesiones (**A** y **B**) con todos los números naturales menores que un número x , con posibilidades de ser primos, y siendo cada término de la sucesión **B** igual a su pareja de la sucesión **A** más 2.

El estudio del modo como se emparejan, en general, todos los términos no primos de la sucesión **A** con términos de la sucesión **B**, o viceversa, y observando que siempre se forman algunas parejas de primos nos permite desarrollar una fórmula, no probabilística, para calcular de un modo aproximado el número de pares de primos, p y $p + 2$, que sean menores que x . El resultado de esta fórmula tiende a infinito cuando x tiende a infinito lo que permite afirmar que la Conjetura de los Primos Gemelos es verdadera.

En este trabajo se ha usado, aparte de algunos axiomas, el teorema de los números primos enunciado por Gauss y el teorema de los números primos para progresiones aritméticas.

1. Números primos y números compuestos.

Se denomina *primo* a todo número natural, mayor que 1, que solo tiene dos divisores, el 1 y el propio número.

Ejemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tal como demostró el matemático griego Euclides, existen infinitos números primos aunque son más escasos a medida que avanzamos en la recta numérica.

Excepcionalmente el 2 y el 3, todos los números primos son de la forma $(6n + 1)$ o $(6n - 1)$ siendo n número natural.

Podemos diferenciar a los primos 2, 3 y 5 del resto. El 2 es el primer primo y el único que es par, el 3 es el único de la forma $(6n - 3)$ y el 5 es el único acabado en 5. Todos los otros primos son impares y su cifra final será 1, 3, 7 o 9.

En contraposición a los números primos, se denomina *compuesto* a todo número natural que tiene más de dos divisores.

Ejemplos de números compuestos: 4 (divisores 1, 2, 4), 6 (1, 2, 3, 6), 15 (1, 3, 5, 15), 24 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24).

Excepto el 1 todo número natural es primo o compuesto. Por convenio el número 1 no se considera ni primo ni compuesto ya que solo tiene un divisor.

Podemos clasificar el conjunto de los números primos (excepto 2, 3 y 5) en 8 grupos dependiendo de la situación de cada uno de ellos respecto a múltiplos de 30, ($30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$). Siendo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \infty$.

$30n + 7$ $30n + 11$ $30n + 13$ $30n + 17$ $30n + 19$ $30n + 23$ $30n + 29$ $30n + 31$

Estas expresiones representan las progresiones aritméticas de módulo 30, $(30n + b)$, tales que $\text{mcd}(30, b) = 1$ y correspondiendo los 8 términos b a los 8 primeros números primos mayores que 5. El siguiente primo, el 37, ya es el segundo del grupo $(30n + 7)$.

Estos 8 grupos contienen todos los números primos (excepto 2, 3 y 5). También incluyen todos los números compuestos que sean múltiplos de primos mayores que 5. Al ser 30 y b primos entre sí no pueden contener múltiplos de 2 ni de 3 ni de 5.

Lógicamente, a medida que aumenta n disminuye la proporción de primos y aumenta la de compuestos que hay en cada grupo.

Enunciado del teorema de Dirichlet^[1]: “Una progresión aritmética $(an + b)$ tal que $\text{mcd}(a, b) = 1$ contiene infinitos números primos”.

Aplicando este teorema a los 8 grupos descritos podemos afirmar que cada uno de ellos contiene infinitos números primos.

También se puede aplicar el teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2]: “Para todo módulo a , los números primos tienden a distribuirse equitativamente entre las diferentes progresiones $(an + b)$ tales que $\text{mcd}(a, b) = 1$ ”.

Para verificar la precisión de este teorema y mediante un autómata programable (PLC), como los usados para el control automático de máquinas, he obtenido los siguientes datos:

Hay 50.847.531 primos menores que 10^9 , (2, 3 y 5 no incluidos), distribuidos del siguiente modo:

Grupo $(30n + 7)$	6.356.475 primos	12,50104946 %	$50.847.531 / 6.356.475 = 7,999328401$
Grupo $(30n + 11)$	6.356.197 primos	12,50050273 %	$50.847.531 / 6.356.197 = 7,999678267$
Grupo $(30n + 13)$	6.356.062 primos	12,50023723 %	$50.847.531 / 6.356.062 = 7,999848176$
Grupo $(30n + 17)$	6.355.839 primos	12,49979866 %	$50.847.531 / 6.355.839 = 8,000128858$
Grupo $(30n + 19)$	6.354.987 primos	12,49812307 %	$50.847.531 / 6.354.987 = 8,001201419$
Grupo $(30n + 23)$	6.356.436 primos	12,50097276 %	$50.847.531 / 6.356.436 = 7,999377481$
Grupo $(30n + 29)$	6.356.346 primos	12,50079576 %	$50.847.531 / 6.356.346 = 7,999490745$
Grupo $(30n + 31)$	6.355.189 primos	12,49852033 %	$50.847.531 / 6.355.189 = 8,0009471$

Podemos comprobar que la desviación máxima para 10^9 , (entre 6.354.987 y el valor medio 6.355.941), es menor que 0,01502 %.

Deduzco que, en cumplimiento de este teorema, la desviación máxima tiende a 0 % a medida que analizamos números más grandes.

2. Definición de números primos gemelos.

Los primos 2 y 3 son números naturales consecutivos por lo que están a la menor distancia posible. Como el resto de primos son impares la distancia mínima es 2 ya que siempre hay un número par entre dos impares consecutivos. Ejemplos: (5, 7), (11, 13). Se denominan Primos Gemelos a las parejas de primos que están separados solo por un número par. La conjetura enunciada al principio propone que su número es infinito. Dado que es una conjetura, aún no ha sido demostrada. En el presente trabajo, y partiendo de un planteamiento diferente al usado en la investigación matemática, se expone una prueba para resolverla. Las primeras parejas de primos gemelos son (3, 5) y (5, 7). Contienen el 3 y el 5 que no aparecen en los 8 grupos de primos. Estos mismos primos (3, 5, 7) forman el único caso posible de primos trillizos. No pueden aparecer más trillizos porque no se pueden conseguir otros tres impares consecutivos que sean todos primos ya que uno de ellos será un número compuesto múltiplo de 3.

3. Combinaciones de grupos de primos que generan primos gemelos.

Escribamos las 3 combinaciones de grupos de primos con las cuales se formarán todas las parejas de primos gemelos mayores que 7.

$$(30n_1 + 11) \text{ y } (30n_1 + 13)$$

$$(30n_2 + 17) \text{ y } (30n_2 + 19)$$

$$(30n_3 + 29) \text{ y } (30n_3 + 31)$$

4. Ejemplo.

Se puede aplicar lo descrito al número 780 con la combinación $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$ sirviendo como ejemplo para cualquiera de las 3 combinaciones expuestas y para cualquier número x aunque sea muy grande. Usaré la lista de los primos menores que 1.000.

Escribiremos la sucesión **A** de todos los números $(30n_1 + 11)$ desde 0 a 780. Resaltamos en **negrita** los números primos. También escribiremos la sucesión **B** de todos los números $(30n_1 + 13)$ desde 0 a 780.

A 11-41-71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761
B 13-43-73-103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493-523-553-583-613-643-673-703-733-763

En las dos sucesiones anteriores están subrayadas las 11 parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) que son menores que 780. El estudio de las sucesiones **A** y **B**, individual y en conjunto, es la base de esta demostración.

Para calcular el número de términos de cada una de las sucesiones **A** o **B** recordemos que son progresiones aritméticas de módulo 30.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para x . Obviamente, es igual al número de parejas que se forman.
 (26 términos en cada sucesión y 26 parejas que se forman para $x = 780$).

Analizando, con carácter general, la fórmula anterior y para la combinación $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$, tenemos:

Número de términos y de parejas = resultado fórmula	si x es múltiplo de 30.
Número de términos y de parejas = parte entera resultado	si la parte decimal es menor que 13/30.
Número de términos y de parejas = (parte entera resultado) + 1	si la parte decimal es igual o mayor que 13/30.

Para la combinación $(30n_2 + 17)$ y $(30n_2 + 19)$:

Número de términos y de parejas = resultado fórmula	si x es múltiplo de 30.
Número de términos y de parejas = parte entera resultado	si la parte decimal es menor que 19/30.
Número de términos y de parejas = (parte entera resultado) + 1	si la parte decimal es igual o mayor que 19/30.

Y para la combinación $(30n_3 + 29)$ y $(30n_3 + 31)$:

Número de términos y de parejas = (resultado fórmula) - 1	si x es múltiplo de 30.
Número de términos y de parejas = parte entera resultado	si x no es múltiplo de 30.

5. La conjetura aplicada a números pequeños.

Según hemos visto, los números compuestos presentes en los 8 grupos de primos serán múltiplos solamente de primos mayores que 5 (primos 7, 11, 13, 17, 19, 23,...). Indico a continuación los primeros números compuestos que aparecen en ellos.

$$49 = 7^2 \quad 77 = 7 \cdot 11 \quad 91 = 7 \cdot 13 \quad 119 = 7 \cdot 17 \quad 121 = 11^2 \quad 133 = 7 \cdot 19 \quad 143 = 11 \cdot 13 \quad 161 = 7 \cdot 23 \quad 169 = 13^2$$

Y así sucesivamente formando productos, de dos o más factores, con primos mayores que 5.

De lo expuesto deducimos que, para números menores que 49, todos los términos de las sucesiones **A-B** serán números primos y todas las parejas serán primos gemelos. Escribimos todas las parejas entre términos de las sucesiones **A-B** menores que 49.

(11, 13) (41, 43) (17, 19) (29, 31)

Por otro lado, observamos que en las sucesiones **A-B** del número 780, que se ha usado como ejemplo, predominan los números primos (17 primos y 9 compuestos en cada sucesión). Este hecho se manifiesta para números pequeños (hasta $x \approx 4.500$). Por lo tanto, para números menores que 4.500 está asegurada la generación de parejas de primos gemelos con las sucesiones **A** y **B** ya que, aún en el caso hipotético que todos los números compuestos estén emparejados con números primos, siempre sobrarán, en las dos sucesiones, algunos primos que formarán parejas entre ellos. Aplicando este razonamiento al número 780 tendríamos: $17 - 9 = 8$ parejas de primos gemelos como mínimo (acabados en 1 y 3) (en el capítulo anterior hemos visto que son 11 parejas).

6. Aplicando el razonamiento lógico a la conjetura.

Las sucesiones **A** y **B** están formadas por términos que pueden ser números compuestos o números primos que forman parejas entre ellos. Para diferenciar, definiré como **compuesto libre** aquel que no está emparejado con otro compuesto por lo que su pareja será un número primo de la otra sucesión. Por lo tanto, las parejas entre los términos de las sucesiones **A-B** estarán formadas por:

(Número compuesto sucesión **A**) + (Número compuesto sucesión **B**) (parejas **CC**)
 (Número compuesto libre de **A** o de **B**) + (Número primo de **B** o de **A**) (parejas **CP-PC**)
 (Número primo sucesión **A**) + (Número primo sucesión **B**) (parejas **PP**)

Sustituimos los números primos por **P** y los compuestos por **C** en las sucesiones **A-B** del número 780 usado como ejemplo.

A P P P P P C P C P P P C C P P P P C C C P C P C P
B P P P P C P P C P P C P C P P C P C C P P P C P C

El número de parejas primo-primo gemelos (P_G) que se formen dependerá del número de compuestos (libres) de una sucesión que estén emparejados con primos de la otra. Con carácter general, se cumplirá el siguiente axioma:

$$P_G = (N^\circ \text{ de primos sucesión } A) - (N^\circ \text{ de compuestos libres suces. } B) = (N^\circ \text{ de primos suces. } B) - (N^\circ \text{ de compuestos libres suces. } A)$$

Para el número 780: $P_G = 17 - 6 = 17 - 6 = 11$ parejas de primos gemelos en las sucesiones **A-B**.

Considero que este axioma es perfectamente válido aunque sea muy simple y “evidente”. Se usará más adelante en la demostración.

Teniendo en cuenta el axioma anterior, deduzco que siempre se deben formar las suficientes parejas de números compuestos entre las dos sucesiones para que los compuestos de la sucesión **A** que queden libres no superen en número a los primos de la sucesión **B**. Inversamente, los compuestos de la sucesión **B** que queden libres no deben superar en número a los primos de la sucesión **A**. Esto es especialmente importante para sucesiones **A-B** de números muy grandes en las que la proporción de números primos es mucho menor que la de compuestos. Esta cuestión se verá con más detalle cuando se aplique el álgebra a las sucesiones **A-B**.

Con lo descrito anteriormente se puede idear un razonamiento lógico que permita deducir que la conjetura de los Primos Gemelos es verdadera. Más adelante se desarrollará una fórmula general para calcular, de un modo aproximado, el número de parejas de primos gemelos menores que un número x .

Tal como he indicado, la generación de parejas de primos gemelos está asegurada para números pequeños (menores que 4.500) ya que en las sucesiones **A-B** correspondientes predominan los números primos. Por lo tanto, en estas sucesiones encontraremos parejas **PP** (por haber mayoría de primos) y, si hay números compuestos, parejas **CC** y parejas **CP-PC**.

Si verificamos números cada vez más grandes notamos que ya predominan los números compuestos y disminuye la proporción de primos. Supongamos que a partir de un número suficientemente grande no aparecerán más primos gemelos.

En este supuesto entiendo que, al aumentar x , cada primo nuevo que aparezca en la sucesión **A** tendría, como pareja, a un compuesto nuevo en la sucesión **B**. Inversamente, cada primo nuevo que aparezca en la sucesión **B** tendría, como pareja, a un compuesto nuevo en la sucesión **A**. Recordemos que, a medida que aumenta x , irán apareciendo infinitos primos en cada una de las sucesiones **A** y **B**.

Si la conjetura fuera falsa, estas parejas con un término primo (primo-compuesto y compuesto-primo) irían apareciendo, y sin que se formara ninguna pareja primo-primo, en las tres combinaciones de grupos de primos que generan primos gemelos desde el número suficientemente grande que hemos supuesto hasta el infinito, lo cual es difícilmente aceptable. Aunque este razonamiento no sirva como demostración, me permite deducir que la conjetura de los Primos Gemelos es verdadera. Más adelante reforzaré esta deducción mediante la fórmula para calcular el número aproximado de pares de primos gemelos menores que x .

7. Estudiando cómo son las parejas entre los términos de las sucesiones A-B.

Analizaré cómo se forman las parejas compuesto-compuesto con las sucesiones **A** y **B**. Cuanto mayor es la proporción de parejas CC quedan menos compuestos libres que necesiten un primo como pareja y, por lo tanto, habrá más números primos para emparejarse.

El secreto de la Conjetura de los Primos Gemelos está en el número de parejas compuesto-compuesto que se forman con las sucesiones A y B.

Recordemos que en las sucesiones **A-B**, aparte de primos, hay números compuestos que son múltiplos de primos mayores que 5. Para la siguiente exposición consideremos m número natural, no múltiplo de 2 ni de 3 ni de 5 y j número natural (incluido el 0). Analizando las parejas entre los términos de las sucesiones **A-B**, y en relación con los números primos (7, 11, 13,...), deducimos que:

Todos los múltiplos de 7 ($7m_{11}$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos ($7m_{11} + 2$) de la sucesión **B**.
 Todos los múltiplos de 11 ($11m_{12}$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos ($11m_{12} + 2$) de la sucesión **B**.
 Todos los múltiplos de 13 ($13m_{13}$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos ($13m_{13} + 2$) de la sucesión **B**.
 Todos los múltiplos de 17 ($17m_{14}$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos ($17m_{14} + 2$) de la sucesión **B**.

Y así sucesivamente, desde el primo 7 hasta el anterior a \sqrt{x} , ya que son suficientes estos primos para definir a todos los múltiplos de las sucesiones **A-B**. Para esta cuestión, debemos tener en cuenta que un número primo es múltiplo de sí mismo.

Análogamente, deducimos que:

Todos los términos ($7m_{21} - 2$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los múltiplos de 7 ($7m_{21}$) de la sucesión **B**.
 Todos los términos ($11m_{22} - 2$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los múltiplos de 11 ($11m_{22}$) de la sucesión **B**.
 Todos los términos ($13m_{23} - 2$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los múltiplos de 13 ($13m_{23}$) de la sucesión **B**.
 Todos los términos ($17m_{24} - 2$) de la sucesión **A** están emparejados con todos los múltiplos de 17 ($17m_{24}$) de la sucesión **B**.

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Resumiendo lo anterior, se puede definir el siguiente axioma:

Todos los grupos de múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **A** están emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de términos ($7m_{11} + 2$), ($11m_{12} + 2$), ($13m_{13} + 2$), ($17m_{14} + 2$),... de la sucesión **B**.

Inversamente, todos los grupos de términos ($7m_{21} - 2$), ($11m_{22} - 2$), ($13m_{23} - 2$), ($17m_{24} - 2$),... de la sucesión **A** están emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, 13m_{23}, 17m_{24}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **B**.

Apliquemos lo anterior al número 780 sirviendo como ejemplo para cualquier número x aunque sea muy grande. $\sqrt{780} = 27,93$

En la sucesión **A** subrayamos todos los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, 19m_{15}$ y $23m_{16}$.

Y en la **B** subrayamos todos los términos ($7m_{11} + 2$), ($11m_{12} + 2$), ($13m_{13} + 2$), ($17m_{14} + 2$), ($19m_{15} + 2$) y ($23m_{16} + 2$).

A 11-41-71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761

B 13-43-73-103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493-523-553-583-613-643-673-703-733-763

Ahora, en la sucesión **A** subrayamos todos los términos ($7m_{21} - 2$), ($11m_{22} - 2$), ($13m_{23} - 2$), ($17m_{24} - 2$), ($19m_{25} - 2$) y ($23m_{26} - 2$).

Y en la **B** subrayamos todos los múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, 13m_{23}, 17m_{24}, 19m_{25}$ y $23m_{26}$.

A 11-41-71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761

B 13-43-73-103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493-523-553-583-613-643-673-703-733-763

Los términos que no han sido subrayados forman las 10 parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) que hay entre $\sqrt{780}$ y 780. Añadimos la pareja de primos (11, 13) que han sido subrayados por ser múltiplo de 11 ($11m_{12}$), el primero, y ($11m_{12} + 2$) el segundo.

(41, 43) (71, 73) (101, 103) (191, 193) (281, 283) (311, 313) (431, 433) (461, 463) (521, 523) (641, 643) (11, 13)

Se puede comprobar que todos los múltiplos $7m, 11m, 13m, 17m, 19m, 23m, \dots$ de una sucesión se emparejan con múltiplos o primos de la otra formando parejas múltiplo-múltiplo, múltiplo-primo y primo-múltiplo de acuerdo con el axioma que se ha definido.

Al final, las parejas primo-primo sobrantes son los pares de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x .

La exposición anterior nos ayuda a entender la relación que hay entre la sucesión **A** y la sucesión **B** de cualquier número x .

Para apoyar numéricamente el axioma expuesto, y usando un autómata programable, he obtenido datos sobre las sucesiones **A-B** correspondientes a varios números x , (10^6 a 10^9), y que se pueden consultar a partir de la página 16.

8. Demostrando la conjetura.

Usaré como punto de partida la primera parte del axioma del capítulo anterior.

Todos los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **A** están emparejados, respectivamente, con todos los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ de la sucesión **B**.

En este axioma, el concepto de *múltiplo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B** incluye los números compuestos y los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes. Según esta definición, todos los términos menores que \sqrt{x} de cada sucesión son *múltiplos*.

Paralelamente, e igualmente en este axioma, el concepto de *primo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B** se refiere solamente a los primos mayores que \sqrt{x} que estén presentes en la sucesión.

Por esta cuestión, a partir de este punto, en vez de referirme a números compuestos lo haré a números *múltiplos*. Según este concepto, las parejas de términos estarán formadas por múltiplo-múltiplo, múltiplo libre-primo, primo-múltiplo libre y parejas primo-primo.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número x . (Página 2)

$\pi(x)$ Símbolo^[3] normalmente usado para expresar el número real de primos menores o iguales que x .

Según el teorema de los números primos^[3]: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1$ $\ln(x)$ = logaritmo natural de x

Una mejor aproximación para este teorema viene dada por la integral logarítmica desplazada: $\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dy}{\ln(y)}$

Según estas fórmulas, para todo $x \geq 5$ se cumple $\pi(x) > \sqrt{x}$. Esta desigualdad se hace mayor a medida que aumenta x .

$\pi(ax)$ Símbolo para expresar el número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **A** para x .

$\pi(bx)$ Símbolo para expresar el número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **B** para x .

Para valores grandes de x se puede aceptar: $\pi(ax) \approx \pi(bx) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo 8 el número de grupos de primos (página 1).

Para $x = 10^9$ el error máximo de la aproximación anterior es 0,0215 % para el grupo $(30n + 19)$.

$\frac{x}{30} - \pi(ax)$ Número de múltiplos de la sucesión **A** para x .

$\frac{x}{30} - \pi(bx)$ Número de múltiplos de la sucesión **B** para x .

Definiremos como fracción $k(ax)$ de la sucesión **A** o $k(bx)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión. Como la densidad de los números primos disminuye a medida que avanzamos en la recta numérica, los valores de $k(ax)$ y $k(bx)$ aumentan gradualmente al aumentar x y tienden a 1 cuando x tiende a infinito.

$$k(ax) = \frac{\frac{x}{30} - \pi(ax)}{\frac{x}{30}} = 1 - \frac{\pi(ax)}{\frac{x}{30}} \quad \text{Para la sucesión A: } k(ax) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x} \quad \text{Para la sucesión B: } k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x}$$

La cuestión central de este capítulo es desarrollar una fórmula general para calcular el número de múltiplos que hay en los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ de la sucesión **B** y que, cumpliendo el axioma de origen, están emparejados con un número igual de los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ de la sucesión **A**. Conocido este dato, se puede calcular el número de múltiplos de la sucesión **A** que quedan libres (y que están emparejados con primos de la **B**). Finalmente, los primos restantes de la sucesión **B** estarán emparejados con primos de la **A** determinando el número de parejas de primos gemelos que se forman.

Para ello vamos a estudiar los términos $(7m + 2), (11m + 2), (13m + 2), (17m + 2), \dots$ de la sucesión **B** de modo general.

Con un procedimiento análogo se pueden estudiar los términos $(7m - 2), (11m - 2), (13m - 2), (17m - 2), \dots$ de la sucesión **A** si usáramos la segunda parte del axioma de referencia del capítulo anterior.

Analicemos cómo están distribuidos los números primos entre los términos $(7m + 2), (11m + 2), (13m + 2), (17m + 2), \dots$

Para ello veamos la relación entre el primo 7 y los 8 grupos de primos sirviendo como ejemplo para cualquier primo mayor que 5.

Veamos cómo son los grupos de múltiplos de 7 ($7m$) y los grupos $(7j + a)$ en general o sea $(7j + 1), (7j + 2), (7j + 3), (7j + 4), (7j + 5)$ y $(7j + 6)$ de la sucesión **B**. Considerando que es un axioma, deduzco que son progresiones aritméticas de módulo 210, ($210 = 7 \cdot 30$).

En las siguientes expresiones, las 8 progresiones aritméticas de módulo 210 se corresponden, respectivamente, con los 8 grupos de primos de módulo 30. Resalto en **negrita** el número primo que identifica a cada uno de estos 8 grupos.

Subrayo los grupos de términos que aparecerán en las tres sucesiones **B** de esta conjetura. Siendo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \infty$.

$(210n + 7)$, $(210n + 150 + 11)$, $(210n + 120 + 13)$, $(210n + 60 + 17)$, $(210n + 30 + 19)$, $(210n + 180 + 23)$, $(210n + 90 + 29)$ y $(210n + 60 + 31)$ son múltiplos de 7 ($7m$). Estos grupos no contienen números primos salvo el 7 en el grupo $(210n + 7)$ para $n = 0$.

$(210n + 120 + 7)$, $(210n + 60 + 11)$, $(210n + 30 + 13)$, $(210n + 180 + 17)$, $(210n + 150 + 19)$, $(210n + 90 + 23)$, $(210n + 29)$ y $(210n + 180 + 31)$ son términos $(7j + 1)$. En el grupo $(210n + 180 + 31)$ observamos que $180 + 31 = 211 > 210$.

$(210n + 30 + 7)$, $(210n + 180 + 11)$, $(210n + 150 + 13)$, $(210n + 90 + 17)$, $(210n + 60 + 19)$, $(210n + 23)$, $(210n + 120 + 29)$ y $(210n + 90 + 31)$ son términos $(7j + 2)$. Los tres grupos subrayados son términos $(7m + 2)$.

$(210n + 150 + 7)$, $(210n + 90 + 11)$, $(210n + 60 + 13)$, $(210n + 17)$, $(210n + 180 + 19)$, $(210n + 120 + 23)$, $(210n + 30 + 29)$ y $(210n + 31)$ son términos $(7j + 3)$.

$(210n + 60 + 7)$, $(210n + 11)$, $(210n + 180 + 13)$, $(210n + 120 + 17)$, $(210n + 90 + 19)$, $(210n + 30 + 23)$, $(210n + 150 + 29)$ y $(210n + 120 + 31)$ son términos $(7j + 4)$.

$(210n + 180 + 7)$, $(210n + 120 + 11)$, $(210n + 90 + 13)$, $(210n + 30 + 17)$, $(210n + 19)$, $(210n + 150 + 23)$, $(210n + 60 + 29)$ y $(210n + 30 + 31)$ son términos $(7j + 5)$.

$(210n + 90 + 7)$, $(210n + 30 + 11)$, $(210n + 13)$, $(210n + 150 + 17)$, $(210n + 120 + 19)$, $(210n + 60 + 23)$, $(210n + 180 + 29)$ y $(210n + 150 + 31)$ son términos $(7j + 6)$.

Comprobamos que los grupos de múltiplos de 7 ($7m$) de la sucesión **B** se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 210, $(210n + b)$, tales que $\text{mcd}(210, b) = 7$ siendo b menor que 210, múltiplo de 7 y habiendo 8 términos b , uno de cada grupo de primos.

Igualmente comprobamos que los grupos de términos $(7j + 1)$, $(7j + 2)$, $(7j + 3)$, $(7j + 4)$, $(7j + 5)$ y $(7j + 6)$ de la sucesión **B** se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 210, $(210n + b)$, tales que $\text{mcd}(210, b) = 1$ siendo b menor que 212, no divisible por 7 y habiendo 48 términos b , 6 de cada grupo de primos. En esta conjetura los términos $(7j + 2)$ son $(7m + 2)$.

Finalmente, podemos comprobar que los 56 términos b , $(8 + 48)$, son todos los que hay en los 8 grupos de primos menores que 212.

Aplicando el axioma anterior para todo p (número primo mayor que 5 y menor que \sqrt{x}) se puede afirmar que los grupos de múltiplos de p (pm) de la sucesión **B** se corresponden con progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = p$ siendo b menor que $30p$, múltiplo de p y habiendo 8 términos b , uno de cada grupo de primos.

Igualmente se puede afirmar que los grupos de términos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ de la sucesión **B** se corresponden con progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = 1$ siendo b menor que $(30p + 2)$, no divisible por p y habiendo $8(p - 1)$ términos b , $(p - 1)$ de cada grupo de primos. En esta conjetura los términos $(pj + 2)$ son $(pm + 2)$.

Finalmente, se puede afirmar que los $8p$ términos b , $(8 + 8(p - 1))$, son los que hay en los 8 grupos de primos menores que $(30p + 2)$.

Por otro lado, un axioma que se cumple en las sucesiones **A** o **B** es que en cada conjunto de p términos consecutivos hay uno de cada uno de los siguientes grupos: pm , $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ (aunque no necesariamente en este orden). Ejemplo:

13	43	73	103	133	163	193	Términos $(30n + 13)$
$(7 \cdot 1 + 6)$	$(7 \cdot 6 + 1)$	$(7 \cdot 10 + 3)$	$(7 \cdot 14 + 5)$	$7 \cdot 19$	$(7 \cdot 23 + 2)$	$(7 \cdot 27 + 4)$	Términos $7m$ y $(7j + a)$

Por lo tanto, y según este axioma, $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ será el número de múltiplos de p (pm) (incluido p si lo hubiera) y, también, el número de términos de cada uno de los grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ que hay en cada sucesión **A** o **B**.

Este mismo axioma permite afirmar que estos grupos contienen todos los términos de las sucesiones **A** o **B** del siguiente modo:

1. Grupo pm : contiene todos los múltiplos de p .
2. Grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 1)$: contienen todos los múltiplos (excepto los de p) y los primos mayores que \sqrt{x} .

Según se ha descrito, los grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ de la sucesión **B** (e igualmente de la **A**) son progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = 1$.

Aplicando el teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2], expuesto en la página 1, a estos grupos se llega a la conclusión de que todos ellos tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de primos ($\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$) y, como todos ellos tienen el mismo número de términos, también tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de múltiplos.

Del mismo modo, podemos aplicar este teorema a términos que pertenezcan a dos o más grupos. Por ejemplo, los términos que estén, a la vez, en los grupos $(7j + a)$ y $(13j + c)$ se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 2730, $(2730 = 7 \cdot 13 \cdot 30)$. En este caso, todos los grupos de una sucesión **A** o **B** que incluyen estos términos (72 grupos resultado de combinar las 6 a con las 12 c)

tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de primos y, como todos ellos tienen el mismo número de términos, también tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de múltiplos.

Según lo descrito, se deduce que de los $\frac{1}{7} \frac{x}{30}$ términos $(7m + 2)$ que hay en la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{6}$ serán números primos. El resto de términos serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo 7).

En general, se deduce que de los $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ términos $(pm + 2)$ que hay en la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$ serán números primos. El resto de términos serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo p).

Definiremos como fracción $k(7x)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de los términos $(7m + 2)$ y el número total de estos.

Aplicando lo anterior para todo p (número primo mayor que 5 y menor que \sqrt{x}) definiremos como fracción $k(px)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de los términos $(pm + 2)$ y el número total de estos.

Podemos observar la similitud entre $k(bx)$ y los factores $k(7x)$, $k(11x)$, $k(13x)$, $k(17x)$, ..., $k(px)$, ... por lo que sus fórmulas serán parecidas. Usaré \approx en vez de $=$ por la imprecisión en el número de primos que hay en cada grupo.

Usando el mismo procedimiento que para obtener $k(bx)$:

$$k(px) \approx \frac{\frac{1}{p} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{\frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{30p\pi(bx)}{(p-1)x} \quad k(px) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{p}{p-1}$$

Para el primo 7: $k(7x) \approx 1 - \frac{35\pi(bx)}{x}$ Para el primo 11: $k(11x) \approx 1 - \frac{33\pi(bx)}{x}$ Para el primo 31: $k(31x) \approx 1 - \frac{31\pi(bx)}{x}$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Si ordenamos estos factores de menor a mayor valor: $k(7x) < k(11x) < k(13x) < k(17x) < \dots < k(997x) < \dots < k(bx)$

En la fórmula para obtener $k(px)$ tenemos que $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p}{p-1} = 1$ por lo que podemos anotar: $\lim_{p \rightarrow \infty} k(px) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} = k(bx)$

Unificaremos todos los factores $k(7x)$, $k(11x)$, $k(13x)$, ..., $k(px)$, ... en uno solo, que denominaremos $k(jx)$, y que agrupará a todos ellos.

Aplicando lo descrito, definiremos como fracción $k(jx)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de todos los términos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$, ... y el número total de estos.

Lógicamente, el valor de $k(jx)$ estará determinado por los valores de los factores $k(px)$ correspondientes a cada uno de los primos desde el 7 hasta el anterior a \sqrt{x} .

Resumiendo lo expuesto: una fracción $k(jx)$ de los términos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$, ... de la sucesión **B** serán múltiplos y, cumpliendo el axioma de origen, estarán emparejados con una fracción igual de los múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$, ... de la sucesión **A**.

Expresándolo de un modo sencillo y con carácter general:

Una fracción $k(jx)$ de los múltiplos de la sucesión **A** tendrán, como pareja, un múltiplo de la sucesión **B**.

Recordando el axioma de la página 3 y las fórmulas de la página 5 podemos anotar:

Número de parejas múltiplo-múltiplo = $k(jx)$ (Número de múltiplos sucesión **A**)

Número de múltiplos libres sucesión **A** = $(1 - k(jx))$ (Número de múltiplos sucesión **A**)

Nº real de pares de primos gemelos mayores que \sqrt{x} = $P_G(x) = (\text{Nº de primos mayores que } \sqrt{x} \text{ de } \mathbf{B}) - (\text{Nº de múltiplos libres de } \mathbf{A})$

Expresándolo algebraicamente: $P_G(x) = \pi(bx) - (1 - k(jx))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right)$

Supongamos que a partir de un número suficientemente grande no aparecen más primos gemelos. En este caso, para todos los valores de x mayores que el cuadrado de este número se cumpliría que $P_G(x) = 0$ ya que, obviamente, $P_G(x)$ no puede tener valores negativos.

Se puede definir un factor, que denominaré $k(0x)$, que sustituyendo a $k(jx)$ en la fórmula anterior dé como resultado $P_G(x) = 0$.

Como concepto, $k(0x)$ sería el valor mínimo de $k(jx)$ para el cual la conjetura sería falsa.

$$0 = \pi(bx) - (1 - k(0x))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right) \quad \pi(bx) = (1 - k(0x))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right)$$

Despejando: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$

Para que la conjetura sea verdadera, $k(jx)$ debe ser mayor que $k(0x)$ para cualquier valor de x .

Recordemos que el valor de $k(jx)$ está determinado por los valores de cada uno de los factores $k(7x), k(11x), k(13x), k(17x), \dots, k(px), \dots$. Para analizar la relación entre los factores $k(jx)$ y $k(0x)$, primero comparemos $k(0x)$ con el factor general $k(px)$.

$$k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{x}{x - 30\pi(ax)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{1}{1 - \frac{30\pi(ax)}{x}}$$

$$k(px) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{p}{p-1} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$$

Para comparar $k(0x)$ con $k(px)$, simplemente hay que comparar $\frac{30\pi(ax)}{x}$ con $\frac{1}{p}$ que son los términos que diferencian a las dos fórmulas.

Recordemos, página 5, el teorema de los números primos: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo $\pi(x)$ el número real de primos menores o iguales que x .

Tal como he indicado, se puede aceptar que: $\pi(ax) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo 8 el número de grupos de primos.

Sustituyendo $\pi(x)$ por su fórmula correspondiente: $\pi(ax) \sim \frac{x}{8\ln(x)}$

La aproximación de esta última fórmula no afecta al resultado final de la comparación entre $k(0x)$ y $k(px)$ que estamos analizando.

Comparar $\frac{30\pi(ax)}{x}$ con $\frac{1}{p}$ Sustituyendo $\pi(ax)$ por su fórmula correspondiente

Comparar $\frac{30x}{8x\ln(x)}$ con $\frac{1}{p}$

Comparar $\frac{3,75}{\ln(x)}$ con $\frac{3,75}{3,75p}$

Comparar $\ln(x)$ con $3,75p$ Aplicando el concepto de logaritmo natural

Comparar x con $e^{3,75p}$ Para potencias de 10: $\ln 10 = 2,302585$ $3,75 / 2,302585 = 1,6286 \approx 1,63$

Comparar x con $10^{1,63p}$

Resultado comparación: $k(0x)$ será menor que $k(px)$ si $x < 10^{1,63p}$ $k(0x)$ será mayor que $k(px)$ si $x > 10^{1,63p}$

En las siguientes expresiones los valores de los exponentes son aproximados. Esto no afecta al resultado de la comparación.

1. Para el primo 7: $k(0x) < k(7x)$ si $x < 10^{11,4}$ $k(0x) > k(7x)$ si $x > 10^{11,4}$ $\approx 4 \cdot 10^4$ primos menores que $10^{5,7}$

2. Para el primo 11: $k(0x) < k(11x)$ si $x < 10^{18}$ $k(0x) > k(11x)$ si $x > 10^{18}$ $\approx 5,08 \cdot 10^7$ primos menores que 10^9

3. Para el primo 31: $k(0x) < k(31x)$ si $x < 10^{50}$ $k(0x) > k(31x)$ si $x > 10^{50}$ $\approx 1,76 \cdot 10^{23}$ primos menores que 10^{25}

4. Para el primo 997: $k(0x) < k(997x)$ si $x < 10^{1620}$ $k(0x) > k(997x)$ si $x > 10^{1620}$ $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$ primos menores que 10^{810}

Analizando estos datos se puede comprobar que, para números menores que $10^{11,4}$, $k(0x)$ es menor que todos los factores $k(px)$ y, por lo tanto, también será menor que $k(jx)$ lo que permite asegurar que aparecerán parejas de primos gemelos, como mínimo, hasta $10^{5,7}$.

Para valores mayores de x , observamos que $k(0x)$ va superando a los factores $k(px)$, ($k(7x), k(11x), k(13x), k(17x), \dots, k(997x), \dots$).

Observando con detalle comprobamos que si el valor de p , para el que se aplica la comparación, aumenta en modo progresión geométrica, el valor de x a partir del cual $k(0x)$ supera a $k(px)$ aumenta en modo exponencial. Debido a esto, también aumenta en modo exponencial (o ligeramente superior) el número de primos menores que \sqrt{x} y cuyos factores $k(px)$ determinan el valor de $k(jx)$.

Lógicamente, a medida que aumenta el número de primos menores que \sqrt{x} , disminuye el "peso relativo" de cada factor $k(px)$ en relación con el valor de $k(jx)$. Por lo tanto, aunque a partir de $10^{11,4}$ $k(7x)$ sea menor que $k(0x)$, el porcentaje de términos $(7m + 2)$ que no estén también en grupos superiores será cada vez menor y el factor $k(7x)$ irá perdiendo influencia en el valor de $k(jx)$.

Lo mismo se puede aplicar a los factores $k(11x), k(13x), k(17x), \dots$ que irán perdiendo influencia sobre $k(jx)$ a medida que aumenta x .

Por otro lado, tomando como ejemplo el primo 997, comprobamos que cuando $k(0x)$ supera a $k(997x)$ ya hay $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$ primos con cuyos $k(px)$ (que serán mayores que $k(0x)$) añadidos a los $k(7x)$ a $k(997x)$ (165 factores que serán menores que $k(0x)$) se determinará el valor de $k(jx)$. Nótese la gran diferencia que hay entre 165 y $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$.

Estos datos permiten intuir que $k(jx)$ será mayor que $k(0x)$ para cualquier valor de x .

Después de estos datos positivos continuemos el desarrollo de la fórmula que permita calcular el valor aproximado de $k(jx)$. Para ello comparemos $k(bx)$ con $k(jx)$. Recordemos las definiciones referentes a estos dos factores.

$k(bx)$ = relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión **B**.

$$\text{Sucesión B} \quad \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \pi(bx) \text{ primos} \quad \frac{x}{30} - \pi(bx) \text{ múltiplos} \quad k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x}$$

$$\text{Términos sucesión B} \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

$k(jx)$ = relación entre el número de múltiplos que hay en los términos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$,... de la sucesión **B** y el número total de estos. Su valor está determinado por los valores de los factores $k(7x)$, $k(11x)$, $k(13x)$, $k(17x)$,...

Tal como se ha descrito al aplicar el teorema de los números primos para progresiones aritméticas, el número real de primos que hay en cada uno de los grupos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$,... será, aproximadamente, igual al valor medio indicado.

$$\text{Grupo } (7m + 2) \quad \frac{1}{7} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{6} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{7} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{6} \right) \text{ múltiplos} \quad k(7x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{7}{6}$$

$$\text{Términos } (7m + 2) \quad \text{No hay múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ son múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (11m + 2) \quad \frac{1}{11} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{10} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{11} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{10} \right) \text{ múltiplos} \quad k(11x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{11}{10}$$

$$\text{Términos } (11m + 2) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad \text{no hay múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (13m + 2) \quad \frac{1}{13} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{12} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{13} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{12} \right) \text{ múltiplos} \quad k(13x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{13}{12}$$

$$\text{Términos } (13m + 2) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad \text{no hay múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (17m + 2) \quad \frac{1}{17} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{16} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{17} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{16} \right) \text{ múltiplos} \quad k(17x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{17}{16}$$

$$\text{Términos } (17m + 2) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad \text{no hay múltiplos de } 17, \dots$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Se puede comprobar que, en cumplimiento del teorema de los números primos para progresiones aritméticas, los grupos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$,... se comportan con cierta regularidad, definida matemáticamente, respecto al número de términos, de primos y de múltiplos que contienen y que se mantiene con independencia del valor de x .

Siguiendo con el estudio de estos términos veamos algunos datos, obtenidos mediante un autómata programable, referentes al grupo de primos $(30n + 19)$ (escogido como ejemplo) y a los números 10^6 , 10^7 , 10^8 y 10^9 .

Aunque para este análisis se puede escoger cualquier secuencia de primos, lo haré en orden ascendente (7, 11, 13, 17, 19, 23, ..., 307). Son los siguientes datos y están contados del siguiente modo:

1. Número total de términos $(7m + 2)$, $(11m + 2)$, $(13m + 2)$, $(17m + 2)$,...
2. Número de múltiplos en el grupo $(7m + 2)$: están todos incluidos.
3. Número de múltiplos en el grupo $(11m + 2)$: no están incluidos los que también sean $(7m + 2)$.
4. Número de múltiplos en el grupo $(13m + 2)$: no están incluidos los que también sean $(7m + 2)$ o $(11m + 2)$.
5. Número de múltiplos en el grupo $(17m + 2)$: no están incluidos los que también sean $(7m + 2)$ o $(11m + 2)$ o $(13m + 2)$.

Y así sucesivamente hasta el grupo $(307m + 2)$. Pueden consultarse estos datos a partir de la página 16.

Los porcentajes indicados son en relación con el número total de términos $(7m + 2)$, $(11m + 2)$, $(13m + 2)$, $(17m + 2)$,...

	10^6		10^7		10^8		10^9	
Nº términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	23.546		250.283		2.613.261		26.977.923	
Nº múltiplos $(7m + 2)$ y %	3.110	13,21 %	33.738	13,48 %	356.180	13,63 %	3.702.682	13,72 %
Nº múltiplos $(11m + 2)$ y %	1.796	7,63 %	19.062	7,62 %	199.690	7,64 %	2.067.716	7,66 %
Nº múltiplos $(13m + 2)$ y %	1.387	5,89 %	14.764	5,90 %	154.739	5,92 %	1.600.794	5,93 %
Nº múltiplos $(17m + 2)$ y %	1.008	4,28 %	10.553	4,22 %	110.124	4,21 %	1.137.526	4,21 %
Total múltiplos grupos 7 a 307	14.989	63,66 %	156.968	62,72 %	1.642.597	62,86 %	17.013.983	63,07 %

Estos nuevos datos nos siguen confirmando que los grupos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ se comportan de un modo uniforme ya que el porcentaje de múltiplos que suministra cada uno se mantiene prácticamente constante al aumentar x .

La regularidad de estos grupos permite intuir que el valor aproximado de $k(jx)$ se puede obtener mediante una fórmula general.

Teniendo en cuenta los datos de cada grupo, y para desarrollar la fórmula de $k(jx)$, podemos pensar en sumar por un lado el número de términos de todos ellos, por otro el de primos y por último el de múltiplos y efectuar los cálculos con los totales de esas sumas. Este método no es correcto ya que cada término pueda estar en varios grupos por lo que lo contaríamos varias veces lo que nos daría un resultado final poco fiable. Para resolver esta cuestión de un modo teórico pero más preciso se debería analizar, individualmente y aplicando el principio de inclusión-exclusión, cada uno de los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ para definir los que son múltiplos y los que son primos.

Después de varios intentos, he comprobado que este método analítico es bastante complejo por lo que, al final, lo he desestimado.

Espero y deseo que algún matemático interesado en este tema pueda resolver esta cuestión de un modo riguroso.

Ante la dificultad del análisis matemático, he optado por un método indirecto para obtener la fórmula de $k(jx)$.

Informándome en Internet de las últimas demostraciones de conjeturas matemáticas, he leído que se ha aceptado el uso de ordenadores para efectuar una parte de los cálculos o para verificar las conjeturas hasta un número determinado.

Teniendo en cuenta esta información, he considerado que puedo usar un autómata programable (PLC) para que me ayude a obtener la fórmula de $k(jx)$. Para este fin, he desarrollado los diferentes programas que el autómata necesita para esta labor.

Empezaré analizando los datos expuestos de los cuales se puede deducir:

1. Los conceptos de $k(jx)$ y de $k(bx)$ son similares por lo que sus fórmulas serán parecidas usando ambas las mismas variables.
2. Los parámetros (número de términos, de primos y de múltiplos) que intervienen en $k(jx)$ siguen un "patrón" determinado.
3. Los valores de $k(jx)$ y de $k(bx)$, y también los de $\pi(ax)$ y $\pi(bx)$, aumentarán gradualmente al aumentar x .
4. El valor de $k(jx)$ será menor que el de $k(bx)$ pero tenderán a igualarse, de una manera asintótica, cuando x tienda a infinito.

Veamos algunos valores, obtenidos mediante el autómata, referentes a $k(bx)$, $k(jx)$, y al grupo $(30n + 19)$ (consultar a partir página 16).

1. Para 10^6	$k(bx) = 0,706897069$	$k(jx) = 0,700798437$	$k(jx) / k(bx) = 0,991372673$
2. Para 10^7	$k(bx) = 0,751125751$	$k(jx) = 0,747054334$	$k(jx) / k(bx) = 0,99457958$
3. Para 10^8	$k(bx) = 0,783999078$	$k(jx) = 0,780690103$	$k(jx) / k(bx) = 0,995779363$
4. Para 10^9	$k(bx) = 0,809362808$	$k(jx) = 0,806782605$	$k(jx) / k(bx) = 0,996812056$

Analizando estos datos se puede comprobar que, a medida que aumenta x , el valor de $k(jx)$ tiende más rápidamente al valor de $k(bx)$ que el valor de $k(bx)$ con respecto a 1.

Expresándolo numéricamente: Para 10^6 : $(1 - 0,706897069) / (0,706897069 - 0,700798437) = 48,06$
 Para 10^9 : $(1 - 0,809362808) / (0,809362808 - 0,806782605) = 73,88$

A continuación, y partiendo de las fórmulas de $k(bx)$ y $k(0x)$, propondré una para $k(jx)$ con una constante. Para calcular el valor de ésta usaré el autómata.

$$\text{Fórmula de } k(bx): \quad k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \qquad \text{Fórmula de } k(0x): \quad k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$$

$$\text{Fórmula propuesta para } k(jx): \quad k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

Siendo: x = Número para el que se aplica la conjetura y que define las sucesiones **A-B**.

$\pi(ax)$ = Número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **A** para x .

$\pi(bx)$ = Número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **B** para x .

$k(jx)$ = Factor en estudio. Los datos obtenidos por el autómata permiten calcular su valor para varios números x .

$c(jx)$ = Constante que se puede calcular si conocemos los valores de $\pi(ax)$, $\pi(bx)$ y $k(jx)$ para cada número x .

Recordemos que $k(jx)$ es menor que $k(bx)$ por lo que, comparando las dos fórmulas, se deduce que $c(jx)$ tendría un valor mínimo de 0. Igualmente recordemos que, como concepto, $k(0x)$ sería el valor mínimo de $k(jx)$ para el cual la conjetura sería falsa.

Según esta afirmación, y comparando la fórmula de $k(jx)$ con la de $k(0x)$, se deduce que $c(jx)$ tendría un valor máximo de 30.

Vemos que la desviación máxima posible disminuyendo es desde 2,2 hasta 0 (o próximo a 0). Entiendo que, por simetría, la desviación máxima aumentando será similar por lo que, en principio, el valor de $c(jx)$ siempre sería menor que 4,4 y mayor que 0. Por otro lado, y tal como he indicado, $c(jx)$ tendría un valor máximo de 30. Considerando válida la fórmula propuesta como definitiva para $k(jx)$, considerando que será equivalente a la fórmula analítica y comparando 30 con los valores calculados de $c(jx)$, (entre 2,7 y 1,987), se puede aceptar que siempre se cumplirá que $c(jx) < 30$.

Llegados a este punto, hagamos un resumen de las cuestiones expuestas:

1. Todos los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$ de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), \dots$ de la **B**.
2. Los grupos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), \dots$ siguen un “patrón” respecto al número de términos, de primos y de múltiplos que contienen.
3. Se define como $k(jx)$ la fracción de los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), \dots$ de la sucesión **B** que son múltiplos.
4. Lo indicado en el apartado 2 permite intuir que el valor aproximado de $k(jx)$ se puede obtener mediante una fórmula general.
5. Fórmula propuesta para $k(jx)$: $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$. En los cálculos expuestos el valor de $c(jx)$ ha resultado ser menor que 3.
6. Fórmula definitiva para $k(jx)$: $k(jx) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 2,2\pi(ax)}$. Considero que será equivalente a la fórmula obtenida mediante análisis.
7. Considerando válida la fórmula anterior y teniendo en cuenta los valores calculados de $c(jx)$, (< 3), se puede aceptar que $c(jx) < 30$.
8. Aplicando lo indicado en el apartado anterior: $k(jx) > 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} = k(0x)$
9. Finalmente, y para cualquier valor de x : $k(jx) > k(0x)$. Este punto debe quedar rigurosamente demostrado en la fórmula analítica.

Recordemos, página 7, la fórmula para calcular el número de pares de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x en las sucesiones **A-B**.

$$P_G(x) = \pi(bx) - (1 - k(jx))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right) \quad \text{Sustituyendo } k(jx) \text{ por su fórmula: } k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

$$P_G(x) = \pi(bx) - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right) = \pi(bx) - \frac{x\pi(bx) - 30\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)} = \frac{x\pi(bx) - c(jx)\pi(ax)\pi(bx) - x\pi(bx) + 30\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

$$P_G(x) = \frac{(30 - c(jx))\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

Si aplicamos a esta fórmula los valores de $c(jx)$ ya definidos:

$$c(jx) \approx 2,2 \quad P_G(x) \approx \frac{(30 - 2,2)\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,2\pi(ax)} \quad P_G(x) \approx \frac{27,8\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,2\pi(ax)}$$

$$c(jx) < 30 \quad P_G(x) > \frac{(30 - 30)\pi(ax)\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} \quad P_G(x) > 0$$

La expresión final indica que $P_G(x)$ siempre es mayor que 0 y teniendo en cuenta que por su naturaleza, parejas de primos, no puede ser un número fraccionario (debiendo ser mayor que 0 no puede tener un valor entre 0 y 1) deduzco que $P_G(x)$ será un número natural igual o mayor que 1. Igualmente deduzco que el valor de $P_G(x)$ aumentará al aumentar x ya que también aumentan $\pi(ax)$ y $\pi(bx)$. Podemos anotar:

$$P_G(x) \geq 1 \quad P_G(x) \text{ será un número natural y aumentará gradualmente al aumentar } x$$

La expresión anterior indica que el número de parejas de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x siempre es igual o mayor que 1.

Supongamos un número n suficientemente grande. Según lo expuesto siempre habrá, como mínimo, una pareja de primos gemelos entre n y n^2 y, por lo tanto, mayores que n . Esto nos indica que no encontraremos una pareja de primos gemelos que sea mayor y última por lo que, cuando x tienda a infinito, también tenderá a infinito el número de pares de primos gemelos menores que x .

Poniendo como ejemplo el número $6^2 = 36$, podemos comprobar que hay 3 parejas de primos gemelos entre 6 y 36, **(11, 13)**, **(17, 19)** y **(29, 31)** (una por cada combinación de grupos de primos). Para números superiores podemos verificar que a medida que aumenta x , también aumenta el número de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x , (8.134 pares de gemelos para 10^6 y 3.424.019 pares para 10^9).

Con todo lo descrito, se puede afirmar que: **La Conjetura de los Primos Gemelos es verdadera.**

9. Fórmula final.

Considerando ya demostrada la conjetura se puede definir una fórmula para calcular, de un modo aproximado, el número de parejas de primos gemelos menores que x .

Según el capítulo anterior, el número de estos pares que se forman con las sucesiones **A-B** mayores que \sqrt{x} y menores que x es:

$$P_G(x) \approx \frac{27,8\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,2\pi(ax)}$$

Si no se exige precisión en la fórmula final, y para valores grandes de x , se puede considerar lo siguiente:

1. En la página 5 he indicado que: $\pi(ax) \approx \pi(bx) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo $\pi(x)$ el número real de primos o iguales que x .
2. El término $2,2\pi(ax)$ se puede despreciar por ser muy pequeño en comparación con x , (1,4 % de x para 10^9), (0,68 % para 10^{18}).
3. Al aplicar lo anterior aumentará el valor del denominador por lo que, para compensar, en el numerador pondré 28 en vez de 27,8.
4. Los datos expuestos permiten intuir que a medida que x es más grande, el valor medio de $c(jx)$ disminuirá siendo menor que 2,2.
5. El número de pares de primos gemelos menores que \sqrt{x} es muy pequeño respecto al total de parejas menores que x .
Ejemplo: hay 1.870.585.220 pares de primos gemelos menores que 10^{12} de los cuales 8.169, (0,000437 %), son menores que 10^6 .

Teniendo esto en cuenta, se puede modificar ligeramente la fórmula anterior para que resulte más sencilla.

Como concepto final, considero que el resultado de la fórmula obtenida será el número aproximado de pares de primos gemelos menores que x que se forman con las sucesiones **A** y **B**.

$$P_G(x) \approx \frac{28 \frac{\pi(x)}{8} \frac{\pi(x)}{8}}{x} \quad P_G(x) \approx \frac{7 \pi^2(x)}{16 x}$$

Recordemos, página 2, que hay 3 combinaciones de grupos de primos que generan primos gemelos (3 conjuntos de sucesiones **A-B**). Siendo $G_G(x)$ el número real de parejas de primos gemelos menores que x , tenemos:

$$G_G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{16 x} \quad G_G(x) \approx 1,3125 \frac{\pi^2(x)}{x}$$

Obteniendo los valores reales de $\pi(x)$ y $G_G(x)$ de Wikipedia, comprobamos la precisión de la fórmula anterior.

	$\pi(x)$	$G_G(x)$	Resultado fórmula	Diferencia
1. Para 10^6	78.498	8.169	8.087	-1,004 %
2. Para 10^8	5.761.455	440.312	435.676	-1,053 %
3. Para 10^{10}	455.052.511	27.412.679	27.178.303	-0,855 %
4. Para 10^{12}	37.607.912.018	1.870.585.220	1.856.340.998	-0,761 %
5. Para 10^{14}	3.204.941.750.802	135.780.321.665	134.815.427.591	-0,711 %
6. Para 10^{16}	279.238.341.033.925	10.304.195.697.298	10.234.094.207.318	-0,68 %
7. Para 10^{18}	24.739.954.287.740.860	808.675.888.577.436	803.335.756.334.353	-0,66 %

Podemos mejorar la precisión "ajustando" la última fórmula: $G_G(x) \approx 1,32 \frac{\pi^2(x)}{x}$

Fórmula final siendo: $G_G(x)$ = Número real de parejas de primos gemelos menores que x .

x = Número natural mayor que 30.

$\pi(x)$ = Número real de primos menores o iguales que x .

Para expresarlo como una función de x usaremos el teorema de los números primos^[3] (página 5): $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$

Sustituyendo $\pi(x)$, y simplificando, obtenemos una segunda fórmula para $G_G(x)$: $G_G(x) \sim 1,32 \frac{x}{\ln^2(x)}$

El signo \sim indica que esta expresión tiene un comportamiento asintótico dando resultados menores que los reales para números pequeños (-15 % para 10^6) y disminuyendo esta diferencia a medida que analizamos números más grandes (-5 % para 10^{18}).

Una mejor aproximación para el teorema anterior viene dada por la integral logarítmica desplazada^[3]: $\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dy}{\ln(y)}$

Sustituyendo de nuevo $\pi(x)$ en $G_G(x)$: $G_G(x) \approx 1,32 \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)}$

Esta tercera fórmula es la más precisa.

10. Comparación con la investigación sobre esta conjetura.

La investigación^[4] para resolver esta conjetura se centra en demostrar que existen infinitas parejas de primos que están a una distancia igual o menor que una constante. Para los primos gemelos esta constante sería igual a 2 (en este caso, distancia = constante). En abril de 2013 el matemático de origen chino, Yitang Zhang de la Universidad de New Hampshire, presentó un artículo a una revista de matemáticas en el que se demuestra, por primera vez, que el valor máximo de la constante referida es 70 millones.

Terence Tao, de la Universidad de California, propuso el proyecto Polymath para que investigadores matemáticos, basándose en el trabajo de Zhang, pudieran reducir progresivamente este valor. James Maynard, de la Universidad de Montreal, usando el planteamiento original de Zhang pero con un trabajo independiente, ha conseguido que el valor de la constante sea menor que 600.

Para el 28 noviembre de 2013 se ha conseguido llegar hasta 264 y parece ser que se podría reducir a 12 o incluso hasta 6.

Aunque el valor de la constante vaya reduciéndose, y según la opinión de los matemáticos participantes en el proyecto Polymath, es poco probable que, a partir de los trabajos presentados, se pueda llegar a demostrar la conjetura de los primos gemelos.

Recordemos el planteamiento en el que se basa la presente demostración.

1. Se definen las tres combinaciones de progresiones aritméticas con las que se formarán todas las parejas de primos gemelos mayores que 7: $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$ $(30n_2 + 17)$ y $(30n_2 + 19)$ $(30n_3 + 29)$ y $(30n_3 + 31)$
2. Se estudia cómo están emparejados los números compuestos de una progresión con números compuestos o primos de la otra.
3. Mediante este estudio, comprobamos que siempre se forman algunas parejas en las que los dos términos son números primos.
4. Estos primos forman los pares de primos gemelos cuyo número aproximado se puede calcular mediante una fórmula general.
5. El resultado de esta fórmula tiende a infinito cuando n tiende a infinito.

Observamos que para resolver esta conjetura, la investigación matemática y este trabajo usan planteamientos diferentes.

11. Comparación con la conjetura de Hardy-Littlewood.

La conjetura de Hardy-Littlewood^[5] establece una ley de distribución de los números primos gemelos menores que un número x . Comprobamos que es similar al teorema de los números primos el cual determina el número de primos menores o iguales que x .

Esta conjetura dice: “El número de parejas de primos gemelos menores que x es asintóticamente igual a $\pi_2(x) \approx 2C_2 \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)}$ ”.

Siendo $\pi_2(x)$ el número de parejas y C_2 la constante de los primos gemelos definida como el siguiente producto de Euler:

$$C_2 = \prod_{p \geq 3} \frac{p(p-2)}{(p-1)^2} = 0,66016118158... \text{ para todos los primos mayores que } 2.$$

Comparando la última fórmula de la conjetura de los primos gemelos: $G_G(x) \approx 1,32 \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)}$ con la fórmula de la conjetura de

Hardy-Littlewood expresada sustituyendo C_2 por su valor: $\pi_2(x) \approx 1,32032 \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)}$ se puede comprobar que son casi iguales.

Recordemos que la fórmula de $G_G(x)$ se ha obtenido a partir de: $P_G(x) \approx \frac{27,8\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,2\pi(ax)}$ resultando ésta del estudio de los términos

$(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), \dots$ de la sucesión B y siendo el número de pares de primos gemelos que se forman con las sucesiones $A-B$.

12. Comparación con la Conjetura de Goldbach.

Enunciado de la Conjetura de Goldbach^[6]: “Todo número par mayor de 2 se puede expresar como la suma de dos números primos”.

La conjetura de Goldbach y la de los primos gemelos son similares ya que ambas se pueden estudiar combinando dos grupos de primos para obtener parejas de primos que sumen un número par, en la primera, o parejas de primos gemelos en la segunda.

Las demostraciones que he desarrollado para estas dos conjeturas son parecidas.

Según la demostración, el número de parejas de primos que suman un número par x (potencia de 2) es: $G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{32 x}$

Para número par x múltiplo de 10: $G_{10}(x) \approx \frac{7 \pi^2(x)}{8 x}$

Según hemos visto, el número de parejas de primos gemelos menores que x es: $G_G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{16 x}$

Comparando las fórmulas se puede comprobar que para un número par x que sea una potencia de 2, el número de parejas de primos que cumplen la conjetura de Goldbach es, aproximadamente, la mitad del número de pares de primos gemelos menores que x . Los siguientes datos se han obtenido usando el autómata programable:

Para $268.435.456 = 2^{28}$ 525.109 parejas de primos que suman 2^{28} siendo ambos mayores que 2^{14} .
 1.055.991 parejas de primos gemelos mayores que 2^{14} y menores que 2^{28} .

Igualmente se puede comprobar que para un número par x que sea múltiplo de 10, el número de parejas de primos que cumplen la conjetura de Goldbach es, aproximadamente, $2/3$ del número de pares de primos gemelos menores que x . Usando el autómata:

Para 10^9 2.273.918 parejas de primos que suman 10^9 siendo ambos mayores que $10^{4.5}$.
 3.424.019 parejas de primos gemelos mayores que $10^{4.5}$ y menores que 10^9 .

13. Estudiando parejas de primos con separaciones mayores que 2.

La misma fórmula de los primos gemelos puede servir para calcular el número de parejas de primos *primos* (del inglés *cousin prime*) que tienen la forma $p, p + 4$ y que son menores que un número x .

Las tres combinaciones que generan primos *primos* son: $(30n_1 + 7)$ y $(30n_1 + 11)$, $(30n_2 + 13)$ y $(30n_2 + 17)$, $(30n_3 + 19)$ y $(30n_3 + 23)$. Los primos gemelos y los primos *primos* son siempre números primos consecutivos.

Igualmente se puede aplicar la misma fórmula a parejas de primos con diferencia entre 6 y 30 si no se exige la condición de que sean siempre números primos consecutivos. Por ejemplo, para: $p, p + 8$ y $p, p + 16$.

Con la misma condición, y para los siguientes casos, también sirve la misma fórmula pero el número real de parejas que se forman será mayor ya que 14, 22, 26 y 28 son múltiplos, respectivamente, de 7, 11, 13 y 7.

$$p, p + 14 \quad p, p + 22 \quad p, p + 26 \quad p, p + 28$$

En estos 4 casos será mayor la fracción de los términos $(7m_{11} + a)$, $(11m_{12} + a)$, $(13m_{13} + a)$, $(17m_{14} + a)$,... que son múltiplos.

Para $a = 14$ y para $a = 28$ todos los términos $(7m_{11} + 14)$ y $(7m_{11} + 28)$ son múltiplos de 7.

Para $a = 22$ todos los términos $(11m_{12} + 22)$ son múltiplos de 11.

Para $a = 26$ todos los términos $(13m_{13} + 26)$ son múltiplos de 13.

El resto de parejas con diferencias entre 6 y 30 tienen más de tres combinaciones de grupos de primos. Si no se exige la condición de que siempre sean consecutivos, tendremos las siguientes fórmulas para calcular el número de parejas de primos menores que x :

$$G_{M6}(x) \approx \frac{21}{8} \frac{\pi^2(x)}{x} \quad \text{Para } p, p + 6 \quad p, p + 12 \quad p, p + 18 \quad p, p + 24 \quad 6 \text{ combinaciones para cada caso}$$

$$G_{M10}(x) \approx \frac{7}{4} \frac{\pi^2(x)}{x} \quad \text{Para } p, p + 10 \quad p, p + 20 \quad 4 \text{ combinaciones para cada caso}$$

$$G_{M30}(x) \approx \frac{7}{2} \frac{\pi^2(x)}{x} \quad \text{Para } p, p + 30 \quad 8 \text{ combinaciones}$$

Analizamos ahora la Conjetura de Polignac^[7].

Enunciado: "Para todo número natural k existen infinitos pares de primos cuya diferencia es $2k$ ".

En el enunciado no está especificada la condición de que los primos $p, p + 2k$ sean siempre números primos consecutivos.

Suponiendo que esta condición no sea necesaria, se puede calcular el número mínimo de pares de primos $p, p + 2k$ menores que x .

En este caso, la diferencia entre los términos de la sucesión **A** y los términos de la sucesión **B** es igual a $2k$ por lo que deduzco que se puede aplicar la fórmula de los primos gemelos para calcular el número de pares de primos entre $2k$ y x .

$$G_k(x) \approx \frac{21}{16} \frac{\pi^2(x)}{x} - \frac{21}{16} \frac{\pi^2(2k)}{2k}$$

La segunda parte de la expresión anterior será una constante. Centrándonos en el primer término comprobamos, de nuevo, que, al aumentar x , aumenta el número de parejas de primos $p, p + 2k$ menores que x . Por lo tanto, no encontraremos una pareja de primos $p, p + 2k$ que sea mayor y última, lo que permite afirmar que la Conjetura de Polignac es verdadera.

Considero válido este razonamiento si no se exige la condición de que los primos $p, p + 2k$ sean siempre primos consecutivos.

Obtención de datos usando un autómata programable

Recordemos: Múltiplos: incluyen los números compuestos y los primos menores que \sqrt{x} .

Primos: solamente los mayores que \sqrt{x} .

Sucesión A

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ y del número de primos es el número total de términos de la sucesión.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 2).
3. La suma del número de múltiplos y del número de primos de la forma $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ de la sucesión **B** (página 4).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
 5. $P_G(x)$ = Número de parejas de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x . Debe coincidir con $P_G(x)$ de la sucesión **B**.
 $P_G(x)$ = (Número de primos sucesión **A**) - (Número de primos de la forma $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ sucesión **A**)
 6. k_{ax} = Número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ dividido por el número total de términos de la sucesión **A**.
 7. k_{jx} = Número de múltiplos que hay en los términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ dividido por el número total de estos.
Fórmula propuesta para k_{jx} : $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - c(jx)\pi(bx)}$ (página 10).
 8. c_{jx} = Constante de la fórmula de k_{jx} anterior. Despejando: $c(jx) = \frac{x - \frac{30\pi(ax)}{1 - k(jx)}}{\pi(bx)}$
 9. k_{0x} = Valor mínimo de k_{jx} para el cual la conjetura sería falsa: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - 30\pi(bx)}$ (páginas 7 y 8).

Sucesión B

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ y del número de primos es el número total de términos de la sucesión.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 2).
3. La suma del número de múltiplos y del número de primos de la forma $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ de la sucesión **A** (página 4).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
 5. $P_G(x)$ = Número de parejas de primos gemelos que hay entre \sqrt{x} y x . Debe coincidir con $P_G(x)$ de la sucesión **A**.
 $P_G(x)$ = (Número de primos sucesión **B**) - (Número de primos de la forma $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ sucesión **B**)
 6. k_{bx} = Número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ dividido por el número total de términos de la sucesión **B**.
 7. k_{jx} = Número de múltiplos que hay en los términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ dividido por el número total de estos.
Fórmula propuesta para k_{jx} : $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$ (página 10).
 8. c_{jx} = Constante de la fórmula de k_{jx} anterior. Despejando: $c(jx) = \frac{x - \frac{30\pi(bx)}{1 - k(jx)}}{\pi(ax)}$
 9. k_{0x} = Valor mínimo de k_{jx} para el cual la conjetura sería falsa: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$ (páginas 7 y 8).

Escogiendo el grupo $(30n + 19)$ como ejemplo, contaremos el número de múltiplos que hay en cada uno de los grupos $(7m + 2), (11m + 2), (13m + 2), \dots$ hasta el grupo $(307m + 2)$. Los valores obtenidos están resaltados en **negrita**.

Aunque se puede usar cualquier secuencia de primos, y para contar cada término solo una vez, lo haremos en sentido ascendente (del primo 7 hasta el 307).

Múltiplos que hay en los términos $(7m + 2)$: están todos incluidos.

Múltiplos que hay en los términos $(11m + 2)$: no están incluidos los que también sean términos $(7m + 2)$.

Múltiplos que hay en los términos $(13m + 2)$: no están incluidos los que también sean términos $(7m + 2)$ o $(11m + 2)$.

En general términos $(pm + 2)$: no están incluidos los que también sean términos de grupos correspondientes a primos menores que p .

Los porcentajes indicados son en relación con el número total de términos $(7m + 2), (11m + 2), (13m + 2), \dots, (pm + 2), \dots$

10^6	(30n ₁ + 11) y (30n ₁ + 13)	33.333 parejas	Primo mayor para dividir	997
Sucesión A (30n ₁ + 11)			Sucesión B (30n ₁ + 13)	
Número total de términos		33.333	Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...		23.545	Múltiplos 7m, 11m,...	23.529
Primos mayores que 10 ³		9.788	Primos mayores que 10 ³	9.804
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		23.529	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	23.545
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		16.464	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	16.464
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		7.065	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	7.081
P _G (x) = Parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) entre 10 ³ y 10 ⁶ Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) menores que 10 ³			P _G (x) = 9.788 - 7.065 = 9.804 - 7.081 = 2.723	
k _{ax} = 0,706357063			k _{bx} = 0,705877058	
k _{jx} = 0,699732245	k _{jx} / k _{ax} = 0,990621148		k _{jx} = 0,699256742	k _{jx} / k _{bx} = 0,990621148
c _{jx} = 2,251409252			c _{jx} = 2,249996341	
k _{ox} = 0,584008613	k _{ox} / k _{ax} = 0,826789514		k _{ox} = 0,583611756	k _{ox} / k _{bx} = 0,826789522

10^6	(30n ₂ + 17) y (30n ₂ + 19)	33.333 parejas	Primo mayor para dividir	997
Sucesión A (30n ₂ + 17)			Sucesión B (30n ₂ + 19)	
Número total de términos		33.333	Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...		23.546	Múltiplos 7m, 11m,...	23.563
Primos mayores que 10 ³		9.787	Primos mayores que 10 ³	9.770
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		23.563	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	23.546
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		16.501	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	16.501
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		7.062	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	7.045
P _G (x) = Parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) entre 10 ³ y 10 ⁶ Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) menores que 10 ³			P _G (x) = 9.787 - 7.062 = 9.770 - 7.045 = 2.725	
k _{ax} = 0,706387063			k _{bx} = 0,706897069	
k _{jx} = 0,700292832	k _{jx} / k _{ax} = 0,991372673		k _{jx} = 0,700798437	k _{jx} / k _{bx} = 0,991372673
c _{jx} = 2,082267247			c _{jx} = 2,083663833	
k _{ox} = 0,584651294	k _{ox} / k _{ax} = 0,827664214		k _{ox} = 0,585073401	k _{ox} / k _{bx} = 0,827664206

Múltiplos (7m + 2)	3.110	13,208 %	Múltiplos (43m + 2)	288	1,223 %	Múltiplos (89m + 2)	130	0,552 %
Múltiplos (11m + 2)	1.796	7,628 %	Múltiplos (47m + 2)	260	1,104 %	Múltiplos (97m + 2)	104	0,442 %
Múltiplos (13m + 2)	1.387	5,891 %	Múltiplos (53m + 2)	228	0,968 %	Múltiplos (101m + 2)	105	0,446 %
Múltiplos (17m + 2)	1.008	4,281 %	Múltiplos (59m + 2)	206	0,875 %	Múltiplos (103m + 2)	102	0,433 %
Múltiplos (19m + 2)	827	3,512 %	Múltiplos (61m + 2)	196	0,832 %	Múltiplos (107m + 2)	107	0,454 %
Múltiplos (23m + 2)	674	2,862 %	Múltiplos (67m + 2)	186	0,79 %	Múltiplos (109m + 2)	93	0,395 %
Múltiplos (29m + 2)	516	2,191 %	Múltiplos (71m + 2)	162	0,688 %	Múltiplos (113m + 2)	96	0,408 %
Múltiplos (31m + 2)	454	1,928 %	Múltiplos (73m + 2)	149	0,633 %	Múltiplos (127m + 2)	91	0,386 %
Múltiplos (37m + 2)	366	1,554 %	Múltiplos (79m + 2)	133	0,565 %	Múltiplos (131m + 2)	88	0,374 %
Múltiplos (41m + 2)	316	1,342 %	Múltiplos (83m + 2)	133	0,565 %	Múltiplos (137m + 2)	77	0,327 %
Múltiplos (139m + 2)	85	0,361 %	Múltiplos (193m + 2)	61	0,259 %	Múltiplos (251m + 2)	43	0,183 %
Múltiplos (149m + 2)	77	0,327 %	Múltiplos (197m + 2)	57	0,242 %	Múltiplos (257m + 2)	41	0,174 %
Múltiplos (151m + 2)	66	0,28 %	Múltiplos (199m + 2)	59	0,251 %	Múltiplos (263m + 2)	43	0,183 %
Múltiplos (157m + 2)	77	0,327 %	Múltiplos (211m + 2)	46	0,195 %	Múltiplos (269m + 2)	47	0,199 %
Múltiplos (163m + 2)	69	0,293 %	Múltiplos (223m + 2)	49	0,208 %	Múltiplos (271m + 2)	39	0,166 %
Múltiplos (167m + 2)	67	0,284 %	Múltiplos (227m + 2)	47	0,199 %	Múltiplos (277m + 2)	40	0,17 %
Múltiplos (173m + 2)	62	0,263 %	Múltiplos (229m + 2)	44	0,187 %	Múltiplos (281m + 2)	44	0,187 %
Múltiplos (179m + 2)	69	0,293 %	Múltiplos (233m + 2)	51	0,217 %	Múltiplos (283m + 2)	37	0,157 %
Múltiplos (181m + 2)	63	0,267 %	Múltiplos (239m + 2)	37	0,157 %	Múltiplos (293m + 2)	38	0,161 %
Múltiplos (191m + 2)	59	0,251 %	Múltiplos (241m + 2)	44	0,187 %	Múltiplos (307m + 2)	40	0,17 %

Número total de múltiplos grupos (7m + 2) a (307m + 2) 14.989 63,658 %

10^6	(30n ₃ + 29) y (30n ₃ + 31)	33.333 parejas	Primo mayor para dividir	997
Sucesión A (30n ₃ + 29)			Sucesión B (30n ₃ + 31)	
Número total de términos		33.333	Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...		23.548	Múltiplos 7m, 11m,...	23.544
Primos mayores que 10 ³		9.785	Primos mayores que 10 ³	9.789
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		23.544	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	23.548
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		16.445	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	16.445
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		7.099	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	7.103

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) entre 10^3 y 10^6
 Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) menores que 10^3

$$P_G(x) = 9.785 - 7.099 = 9.789 - 7.103 = 2.686$$

$k_{ax} = 0,706447064$		$k_{bx} = 0,706327063$	
$k_{jx} = 0,698479442$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,988721558$	$k_{jx} = 0,698360795$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,988721558$
$c_{jx} = 2,700433393$		$c_{jx} = 2,700016271$	
$k_{0x} = 0,584401059$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,827239701$	$k_{0x} = 0,58430179$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,827239703$

10^7 (30n₁ + 11) y (30n₁ + 13) 333.333 parejas

Primo mayor para dividir 3.137

Sucesión A (30n₁ + 11)

Sucesión B (30n₁ + 13)

Número total de términos	333.333	Número total de términos	333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	250.287	Múltiplos 7m, 11m,...	250.310
Primos mayores que 10 ^{3,5}	83.046	Primos mayores que 10 ^{3,5}	83.023
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	250.310	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	250.287
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	187.031	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	187.031
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	63.279	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	63.256

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) entre 10^{3,5} y 10⁷
 Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) menores que 10^{3,5}

$$P_G(x) = 83.046 - 63.279 = 83.023 - 63.256 = 19.767$$

$k_{ax} = 0,75086175$		$k_{bx} = 0,75093075$	
$k_{jx} = 0,747197475$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,995119906$	$k_{jx} = 0,747266138$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,995119906$
$c_{jx} = 1,74597435$		$c_{jx} = 1,746125574$	
$k_{0x} = 0,668227839$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,889947902$	$k_{0x} = 0,668289246$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,889947902$

10^7 (30n₂ + 17) y (30n₂ + 19) 333.333 parejas

Primo mayor para dividir 3.137

Sucesión A (30n₂ + 17)

Sucesión B (30n₂ + 19)

Número total de términos	333.333	Número total de términos	333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	250.283	Múltiplos 7m, 11m,...	250.375
Primos mayores que 10 ^{3,5}	83.050	Primos mayores que 10 ^{3,5}	82.958
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	250.375	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	250.283
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	186.975	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	186.975
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	63.400	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	63.308

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) entre 10^{3,5} y 10⁷
 Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) menores que 10^{3,5}

$$P_G(x) = 83.050 - 63.400 = 82.958 - 63.308 = 19.650$$

$k_{ax} = 0,75084975$		$k_{bx} = 0,751125751$	
$k_{jx} = 0,74677983$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,99457958$	$k_{jx} = 0,747054334$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,99457958$
$c_{jx} = 1,937563656$		$c_{jx} = 1,938229798$	
$k_{0x} = 0,668297995$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,890055569$	$k_{0x} = 0,66854365$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,890055559$

Múltiplos (7m + 2)	33.738	13,48 %	Múltiplos (43m + 2)	3.211	1,283 %	Múltiplos (89m + 2)	1.301	0,52 %
Múltiplos (11m + 2)	19.062	7,616 %	Múltiplos (47m + 2)	2.889	1,154 %	Múltiplos (97m + 2)	1.193	0,477 %
Múltiplos (13m + 2)	14.764	5,899 %	Múltiplos (53m + 2)	2.495	0,997 %	Múltiplos (101m + 2)	1.113	0,445 %
Múltiplos (17m + 2)	10.553	4,216 %	Múltiplos (59m + 2)	2.198	0,878 %	Múltiplos (103m + 2)	1.093	0,437 %
Múltiplos (19m + 2)	8.873	3,545 %	Múltiplos (61m + 2)	2.121	0,847 %	Múltiplos (107m + 2)	1.037	0,414 %
Múltiplos (23m + 2)	6.999	2,796 %	Múltiplos (67m + 2)	1.886	0,753 %	Múltiplos (109m + 2)	1.006	0,402 %
Múltiplos (29m + 2)	5.304	2,119 %	Múltiplos (71m + 2)	1.720	0,687 %	Múltiplos (113m + 2)	957	0,382 %
Múltiplos (31m + 2)	4.846	1,936 %	Múltiplos (73m + 2)	1.667	0,666 %	Múltiplos (127m + 2)	842	0,336 %
Múltiplos (37m + 2)	3.912	1,563 %	Múltiplos (79m + 2)	1.501	0,6 %	Múltiplos (131m + 2)	816	0,326 %
Múltiplos (41m + 2)	3.462	1,383 %	Múltiplos (83m + 2)	1.429	0,571 %	Múltiplos (137m + 2)	761	0,304 %
Múltiplos (139m + 2)	737	0,294 %	Múltiplos (193m + 2)	502	0,2 %	Múltiplos (251m + 2)	381	0,152 %
Múltiplos (149m + 2)	689	0,275 %	Múltiplos (197m + 2)	500	0,2 %	Múltiplos (257m + 2)	390	0,156 %
Múltiplos (151m + 2)	658	0,263 %	Múltiplos (199m + 2)	492	0,197 %	Múltiplos (263m + 2)	385	0,154 %
Múltiplos (157m + 2)	652	0,261 %	Múltiplos (211m + 2)	453	0,181 %	Múltiplos (269m + 2)	370	0,148 %
Múltiplos (163m + 2)	602	0,241 %	Múltiplos (223m + 2)	431	0,172 %	Múltiplos (271m + 2)	354	0,141 %
Múltiplos (167m + 2)	594	0,237 %	Múltiplos (227m + 2)	426	0,17 %	Múltiplos (277m + 2)	355	0,142 %
Múltiplos (173m + 2)	574	0,229 %	Múltiplos (229m + 2)	417	0,167 %	Múltiplos (281m + 2)	368	0,147 %
Múltiplos (179m + 2)	550	0,22 %	Múltiplos (233m + 2)	427	0,171 %	Múltiplos (283m + 2)	362	0,145 %
Múltiplos (181m + 2)	532	0,213 %	Múltiplos (239m + 2)	410	0,164 %	Múltiplos (293m + 2)	349	0,139 %
Múltiplos (191m + 2)	528	0,211 %	Múltiplos (241m + 2)	406	0,162 %	Múltiplos (307m + 2)	325	0,13 %

Número total de múltiplos grupos (7m + 2) a (307m + 2) 156.968 62,716 %

10^7	(30n ₃ + 29) y (30n ₃ + 31)	333.333 parejas	Primo mayor para dividir	3.137
Sucesión A (30n ₃ + 29)			Sucesión B (30n ₃ + 31)	
Número total de términos		333.333	Número total de términos	333.333
Múltiplos 7m, 11m,...		250.369	Múltiplos 7m, 11m,...	250.383
Primos mayores que 10 ^{3.5}		82.964	Primos mayores que 10 ^{3.5}	82.950
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		250.383	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	250.369
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		186.899	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	186.899
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		63.484	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	63.470
P _G (x) = Parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) entre 10 ^{3.5} y 10 ⁷ Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) menores que 10 ^{3.5}			P _G (x) = 82.964 - 63.484 = 82.950 - 63.470 = 19.480	
k _{ax} = 0,751107751			k _{bx} = 0,751149751	
k _{jx} = 0,746452434	k _{jx} / k _{ax} = 0,993802066		k _{jx} = 0,746494174	k _{jx} / k _{bx} = 0,993802066
c _{jx} = 2,213587286			c _{jx} = 2,213701778	
k _{ox} = 0,668652066	k _{ox} / k _{ax} = 0,890221231		k _{ox} = 0,668689456	k _{ox} / k _{bx} = 0,890221231

10^8	(30n ₁ + 11) y (30n ₁ + 13)	3.333.333 parejas	Primo mayor para dividir	9.973
Sucesión A (30n ₁ + 11)			Sucesión B (30n ₁ + 13)	
Número total de términos		3.333.333	Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...		2.613.173	Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.377
Primos mayores que 10 ⁴		720.160	Primos mayores que 10 ⁴	719.956
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		2.613.377	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	2.613.173
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		2.039.991	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	2.039.991
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		573.386	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	573.182
P _G (x) = Parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) entre 10 ⁴ y 10 ⁸ Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) menores que 10 ⁴			P _G (x) = 720.160 - 573.386 = 719.956 - 573.182 = 146.774	
k _{ax} = 0,783951978			k _{bx} = 0,784013178	
k _{jx} = 0,780595757	k _{jx} / k _{ax} = 0,995718844		k _{jx} = 0,780656695	k _{jx} / k _{bx} = 0,995718844
c _{jx} = 2,124723493			c _{jx} = 2,124877608	
k _{ox} = 0,724433211	k _{ox} / k _{ax} = 0,924078554		k _{ox} = 0,724489764	k _{ox} / k _{bx} = 0,924078554

10^8	(30n ₂ + 17) y (30n ₂ + 19)	3.333.333 parejas	Primo mayor para dividir	9.973
Sucesión A (30n ₂ + 17)			Sucesión B (30n ₂ + 19)	
Número total de términos		3.333.333	Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...		2.613.261	Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.330
Primos mayores que 10 ⁴		720.072	Primos mayores que 10 ⁴	720.003
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...		2.613.330	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	2.613.261
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...		2.040.147	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	2.040.147
Primos (7m - 2), (11m - 2),...		573.183	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	573.114
P _G (x) = Parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) entre 10 ⁴ y 10 ⁸ Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) menores que 10 ⁴			P _G (x) = 720.072 - 573.183 = 720.003 - 573.114 = 146.889	
k _{ax} = 0,783978378			k _{bx} = 0,783999078	
k _{jx} = 0,78066949	k _{jx} / k _{ax} = 0,995779363		k _{jx} = 0,780690103	k _{jx} / k _{bx} = 0,995779363
c _{jx} = 2,095325992			c _{jx} = 2,095377223	
k _{ox} = 0,724461928	k _{ox} / k _{ax} = 0,924084067		k _{ox} = 0,724481057	k _{ox} / k _{bx} = 0,924084067

Múltiplos (7m + 2)	356.180	13,63 %	Múltiplos (43m + 2)	33.369	1,277 %	Múltiplos (89m + 2)	13.765	0,527 %
Múltiplos (11m + 2)	199.690	7,641 %	Múltiplos (47m + 2)	29.857	1,143 %	Múltiplos (97m + 2)	12.505	0,478 %
Múltiplos (13m + 2)	154.739	5,921 %	Múltiplos (53m + 2)	25.894	0,991 %	Múltiplos (101m + 2)	11.845	0,453 %
Múltiplos (17m + 2)	110.124	4,214 %	Múltiplos (59m + 2)	22.872	0,875 %	Múltiplos (103m + 2)	11.588	0,443 %
Múltiplos (19m + 2)	93.010	3,559 %	Múltiplos (61m + 2)	21.718	0,831 %	Múltiplos (107m + 2)	11.028	0,422 %
Múltiplos (23m + 2)	73.070	2,796 %	Múltiplos (67m + 2)	19.490	0,746 %	Múltiplos (109m + 2)	10.695	0,409 %
Múltiplos (29m + 2)	55.597	2,127 %	Múltiplos (71m + 2)	18.169	0,695 %	Múltiplos (113m + 2)	10.243	0,392 %
Múltiplos (31m + 2)	50.315	1,925 %	Múltiplos (73m + 2)	17.416	0,666 %	Múltiplos (127m + 2)	9.010	0,345 %
Múltiplos (37m + 2)	40.767	1,56 %	Múltiplos (79m + 2)	15.835	0,606 %	Múltiplos (131m + 2)	8.661	0,331 %
Múltiplos (41m + 2)	35.815	1,371 %	Múltiplos (83m + 2)	14.933	0,571 %	Múltiplos (137m + 2)	8.172	0,313 %
Múltiplos (139m + 2)	7.978	0,305 %	Múltiplos (163m + 2)	6.603	0,253 %	Múltiplos (181m + 2)	5.717	0,219 %
Múltiplos (149m + 2)	7.417	0,284 %	Múltiplos (167m + 2)	6.481	0,248 %	Múltiplos (191m + 2)	5.463	0,209 %
Múltiplos (151m + 2)	7.245	0,277 %	Múltiplos (173m + 2)	6.070	0,232 %	Múltiplos (193m + 2)	5.362	0,205 %
Múltiplos (157m + 2)	6.900	0,264 %	Múltiplos (179m + 2)	5.877	0,225 %	Múltiplos (197m + 2)	5.231	0,2 %

Múltiplos (199m + 2)	5.064	0,194 %	Múltiplos (239m + 2)	4.108	0,157 %	Múltiplos (271m + 2)	3.472	0,133 %
Múltiplos (211m + 2)	4.782	0,183 %	Múltiplos (241m + 2)	3.995	0,153 %	Múltiplos (277m + 2)	3.389	0,13 %
Múltiplos (223m + 2)	4.462	0,171 %	Múltiplos (251m + 2)	3.940	0,151 %	Múltiplos (281m + 2)	3.339	0,128 %
Múltiplos (227m + 2)	4.388	0,168 %	Múltiplos (257m + 2)	3.741	0,143 %	Múltiplos (283m + 2)	3.288	0,126 %
Múltiplos (229m + 2)	4.322	0,165 %	Múltiplos (263m + 2)	3.671	0,14 %	Múltiplos (293m + 2)	3.152	0,121 %
Múltiplos (233m + 2)	4.208	0,161 %	Múltiplos (269m + 2)	3.531	0,135 %	Múltiplos (307m + 2)	3.029	0,116 %

Número total de múltiplos grupos (7m + 2) a (307m + 2) 1.642.597 62,856 %

10^8 (30n₃ + 29) y (30n₃ + 31) 3.333.333 parejas

Primo mayor para dividir 9.973

Sucesión **A** (30n₃ + 29)

Sucesión **B** (30n₃ + 31)

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.453
Primos mayores que 10 ⁴	719.880
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	2.613.501
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	2.040.065
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	573.436

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.501
Primos mayores que 10 ⁴	719.832
Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	2.613.453
Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	2.040.065
Primos (7m + 2), (11m + 2),...	573.388

P_{G(x)} = Parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) entre 10⁴ y 10⁸
Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) menores que 10⁴

P_{G(x)} = 719.880 - 573.436 = 719.832 - 573.388 = 146.444

k_{ax} = 0,784035978
k_{jx} = 0,780587036 k_{jx} / k_{ax} = 0,995601041
c_{jx} = 2,183711332
k_{0x} = 0,724553421 k_{0x} / k_{ax} = 0,924132873

k_{bx} = 0,784050378
k_{jx} = 0,780601373 k_{jx} / k_{bx} = 0,995601041
c_{jx} = 2,183748304
k_{0x} = 0,724566729 k_{0x} / k_{bx} = 0,924132873

10^9 (30n₂ + 11) y (30n₂ + 13) 33.333.333 parejas

Primo mayor para dividir 31.607 raíz 31.622 50.847.534 primos menores que 10⁹

Sucesión **A** (30n₂ + 11)

Sucesión **B** (30n₂ + 13)

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.977.564
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.355.769
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	26.977.700
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	21.762.981
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	5.214.719

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.977.700
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.355.633
Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	26.977.564
Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	21.762.981
Primos (7m + 2), (11m + 2),...	5.214.583

P_{G(x)} = Parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) entre 10^{4,5} y 10⁹
Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) menores que 10^{4,5}

P_{G(x)} = 6.355.769 - 5.214.719 = 6.355.633 - 5.214.583 = 1.141.050

k_{ax} = 0,809326928
k_{jx} = 0,806702609 k_{jx} / k_{ax} = 0,996757406
c_{jx} = 2,136152
k_{0x} = 0,764406568 k_{0x} / k_{ax} = 0,944496644

k_{bx} = 0,809331008
k_{jx} = 0,806706676 k_{jx} / k_{bx} = 0,996757406
c_{jx} = 2,136161818
k_{0x} = 0,764410421 k_{0x} / k_{bx} = 0,944496644

10^9 (30n₂ + 17) y (30n₂ + 19) 33.333.333 parejas

Primo mayor para dividir 31.607 raíz 31.622

Sucesión **A** (30n₂ + 17)

Sucesión **B** (30n₂ + 19)

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.977.923
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.355.410
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	26.978.760
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	21.765.319
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	5.213.441

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.978.760
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.354.573
Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	26.977.923
Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	21.765.319
Primos (7m + 2), (11m + 2),...	5.212.604

P_{G(x)} = Parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) entre 10^{4,5} y 10⁹
Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) menores que 10^{4,5}

P_{G(x)} = 6.355.410 - 5.213.441 = 6.354.573 - 5.212.604 = 1.141.969

k_{ax} = 0,809337698
k_{jx} = 0,806757575 k_{jx} / k_{ax} = 0,996812056
c_{jx} = 2,101125023
k_{0x} = 0,764429131 k_{0x} / k_{ax} = 0,944511954

k_{bx} = 0,809362808
k_{jx} = 0,806782605 k_{jx} / k_{bx} = 0,996812056
c_{jx} = 2,101185605
k_{0x} = 0,764452848 k_{0x} / k_{bx} = 0,944511954

Múltiplos ($7m + 2$)	3.702.682	13,725 %	Múltiplos ($43m + 2$)	343.921	1,275 %	Múltiplos ($89m + 2$)	141.398	0,524 %
Múltiplos ($11m + 2$)	2.067.716	7,664 %	Múltiplos ($47m + 2$)	307.617	1,14 %	Múltiplos ($97m + 2$)	128.286	0,475 %
Múltiplos ($13m + 2$)	1.600.794	5,934 %	Múltiplos ($53m + 2$)	267.143	0,99 %	Múltiplos ($101m + 2$)	121.875	0,452 %
Múltiplos ($17m + 2$)	1.137.526	4,216 %	Múltiplos ($59m + 2$)	235.591	0,873 %	Múltiplos ($103m + 2$)	118.521	0,439 %
Múltiplos ($19m + 2$)	960.190	3,559 %	Múltiplos ($61m + 2$)	224.007	0,83 %	Múltiplos ($107m + 2$)	113.007	0,419 %
Múltiplos ($23m + 2$)	753.641	2,793 %	Múltiplos ($67m + 2$)	200.462	0,743 %	Múltiplos ($109m + 2$)	109.884	0,407 %
Múltiplos ($29m + 2$)	573.335	2,125 %	Múltiplos ($71m + 2$)	186.672	0,692 %	Múltiplos ($113m + 2$)	105.072	0,389 %
Múltiplos ($31m + 2$)	518.291	1,921 %	Múltiplos ($73m + 2$)	179.001	0,663 %	Múltiplos ($127m + 2$)	92.743	0,344 %
Múltiplos ($37m + 2$)	421.045	1,561 %	Múltiplos ($79m + 2$)	162.991	0,604 %	Múltiplos ($131m + 2$)	89.318	0,331 %
Múltiplos ($41m + 2$)	369.577	1,37 %	Múltiplos ($83m + 2$)	153.412	0,569 %	Múltiplos ($137m + 2$)	84.620	0,314 %

Número total de múltiplos grupos ($7m + 2$) a ($307m + 2$) 17.013.983 63,066 %

10^9 ($30n_2 + 29$) y ($30n_2 + 31$) 33.333.333 parejas Primo mayor para dividir 31.607 raíz 31.622

Sucesión A ($30n_2 + 29$)

Número total de términos 33.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **26.977.414**
Primos mayores que $10^{4.5}$ **6.355.919**
Número de términos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... 26.978.563
Múltiplos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **21.763.644**
Primos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **5.214.919**

Sucesión B ($30n_2 + 31$)

Número total de términos 33.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **26.978.563**
Primos mayores que $10^{4.5}$ **6.354.770**
Número de términos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... 26.977.414
Múltiplos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **21.763.644**
Primos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **5.213.770**

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) entre $10^{4.5}$ y 10^9 $P_G(x) = 6.355.919 - 5.214.919 = 6.354.770 - 5.213.770 = 1.141.000$
Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) menores que $10^{4.5}$

$k_{ax} = 0,809322428$		$k_{bx} = 0,809356898$	
$k_{jx} = 0,806701379$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,996761428$	$k_{jx} = 0,806735738$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,996761428$
$c_{jx} = 2,133766434$		$c_{jx} = 2,133850341$	
$k_{0x} = 0,764408544$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,944504337$	$k_{0x} = 0,764441101$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,944504337$

$268.435.456 = 2^{28}$ ($30n_2 + 11$) y ($30n_2 + 13$) 8.947.849 parejas Primo mayor para dividir 16.381 raíz 16.384

Sucesión A ($30n_2 + 11$)

Número total de términos 8.947.849
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **7.119.033**
Primos mayores que 2^{14} **1.828.816**
Número de términos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... 7.119.006
Múltiplos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **5.642.375**
Primos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **1.476.631**

Sucesión B ($30n_2 + 13$)

Número total de términos 8.947.849
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **7.119.006**
Primos mayores que 2^{14} **1.828.843**
Número de términos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... 7.119.033
Múltiplos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **5.642.375**
Primos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **1.476.658**

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) entre 2^{14} y 2^{28} $P_G(x) = 1.828.816 - 1.476.631 = 1.828.843 - 1.476.658 = 352.185$
Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 1 y 3) menores que 2^{14}

$k_{ax} = 0,795613895$		$k_{bx} = 0,795610878$	
$k_{jx} = 0,792579048$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,996185527$	$k_{jx} = 0,792576042$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,996185527$
$c_{jx} = 2,147564373$		$c_{jx} = 2,147556829$	
$k_{0x} = 0,743107939$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,934005732$	$k_{0x} = 0,743105121$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,934005732$

$268.435.456 = 2^{28}$ ($30n_2 + 17$) y ($30n_2 + 19$) 8.947.848 parejas Primo mayor para dividir 16.381 raíz 16.384

Sucesión A ($30n_2 + 17$)

Número total de términos 8.947.848
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **7.119.164**
Primos mayores que 2^{14} **1.828.684**
Número de términos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... 7.119.581
Múltiplos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **5.643.113**
Primos ($7m - 2$), ($11m - 2$),... **1.476.468**

Sucesión B ($30n_2 + 19$)

Número total de términos 8.947.848
Múltiplos $7m, 11m, \dots$ **7.119.581**
Primos mayores que 2^{14} **1.828.267**
Número de términos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... 7.119.164
Múltiplos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **5.643.113**
Primos ($7m + 2$), ($11m + 2$),... **1.476.051**

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) entre 2^{14} y 2^{28}
 Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 7 y 9) menores que 2^{14}

$$P_G(x) = 1.828.684 - 1.476.468 = 1.828.267 - 1.476.051 = 352.216$$

$k_{ax} = 0,795628624$		$k_{bx} = 0,795675228$	
$k_{jx} = 0,792618694$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,996216915$	$k_{jx} = 0,792665121$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,996216915$
$c_{jx} = 2,131026917$		$c_{jx} = 2,131142926$	
$k_{0x} = 0,743147263$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,934037866$	$k_{0x} = 0,743190792$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,934037866$

$268.435.456 = 2^{28}$ (30n₂ + 29) y (30n₂ + 31) 8.947.848 parejas Primo mayor para dividir 16.381 raíz 16.384

Sucesión A (30n ₂ + 29)		Sucesión B (30n ₂ + 31)	
Número total de términos	8.947.848	Número total de términos	8.947.848
Múltiplos 7m, 11m,...	7.119.276	Múltiplos 7m, 11m,...	7.119.387
Primos mayores que 2 ¹⁴	1.828.572	Primos mayores que 2 ¹⁴	1.828.461
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	7.119.387	Número de términos (7m + 2), (11m + 2),...	7.119.276
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	5.642.405	Múltiplos (7m + 2), (11m + 2),...	5.642.405
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	1.476.982	Primos (7m + 2), (11m + 2),...	1.476.871

$P_G(x)$ = Parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) entre 2^{14} y 2^{28}
 Faltan las parejas de primos gemelos (acabados en 9 y 1) menores que 2^{14}

$$P_G(x) = 1.828.572 - 1.476.982 = 1.828.461 - 1.476.871 = 351.590$$

$k_{ax} = 0,795641141$		$k_{bx} = 0,795653547$	
$k_{jx} = 0,792540846$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,9961034$	$k_{jx} = 0,792553203$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,9961034$
$c_{jx} = 2,193948468$		$c_{jx} = 2,193980089$	
$k_{0x} = 0,743155996$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,934034147$	$k_{0x} = 0,743167582$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,934034147$

El autómata usado es muy lento para usarlo en cálculos con números mayores que 10⁹.

Para conocer el valor aproximado de c_{jx} para números superiores podemos usar los datos (*) obtenidos de páginas especializadas de Internet referentes al número de primos y al número de pares de primos gemelos inferiores a un número dado.

10^{10} 455.052.511 primos * 27.412.679 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{10} / 30 = 333.333.333$
 Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $455.052.511 / 8 = 56.881.563$ (1)
 Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $27.412.679 / 3 = 9.137.559$
 Número aproximado de múltiplos 7m, 11m, ... $333.333.333 - 56.881.563 = 276.451.770$ (2)
 Número de términos (7m - 2), (11m - 2), ... es, aproximadamente, igual a número de múltiplos 7m, 11m, ...
 Número aproximado de primos (7m - 2), (11m - 2), ... $56.881.563 - 9.137.559 = 47.744.004$ (3)
 Número aproximado de múltiplos (7m - 2), (11m - 2), ... $276.451.770 - 47.744.004 = 228.707.766$ (4)

Número total de términos sucesión A	333.333.333		
Múltiplos 7m, 11m,...	≈ 276.451.770 (2)	$k_{ax} ≈ 0,82935531$	
Primos mayores que 10 ⁵	≈ 56.881.563 (1)	$k_{jx} ≈ 0,827297166$	$k_{jx} / k_{ax} ≈ 0,99751838$
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 276.451.770 (2)	$c_{jx} ≈ 2,095100568$	
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 228.707.766 (4)	$k_{0x} ≈ 0,794244171$	$k_{0x} / k_{ax} ≈ 0,957664539$
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 47.744.004 (3)	$k_{7x} ≈ 0,800914529$	

10^{11} 4.118.054.813 primo * 224.376.048 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{11} / 30 = 3.333.333.333$
 Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $4.118.054.813 / 8 = 514.756.851$ (1)
 Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $224.376.048 / 3 = 74.792.016$
 Número aproximado de múltiplos 7m, 11m, ... $3.333.333.333 - 514.756.851 = 2.818.576.482$ (2)
 Número de términos (7m - 2), (11m - 2), ... es, aproximadamente, igual a número de múltiplos 7m, 11m, ...
 Número aproximado de primos (7m - 2), (11m - 2), ... $514.756.851 - 74.792.016 = 439.964.835$ (3)
 Número aproximado de múltiplos (7m - 2), (11m - 2), ... $2.818.576.482 - 439.964.835 = 2.378.611.647$ (4)

Número total de términos sucesión A	3.333.333.333		
Múltiplos 7m, 11m,...	≈ 2.818.576.482 (2)	$k_{ax} ≈ 0,845572944$	
Primos mayores que 10 ^{5,5}	≈ 514.756.851 (1)	$k_{jx} ≈ 0,843905305$	$k_{jx} / k_{ax} ≈ 0,998027799$
Número de términos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 2.818.576.482 (2)	$c_{jx} ≈ 2,075447865$	
Múltiplos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 2.378.611.647 (4)	$k_{0x} ≈ 0,817369919$	$k_{0x} / k_{ax} ≈ 0,966646254$
Primos (7m - 2), (11m - 2),...	≈ 439.964.835 (3)	$k_{7x} ≈ 0,819835102$	

10^{12}

37.607.912.018 primos *

1.870.585.220 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{12} / 30 = 33.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$37.607.912.018 / 8 = 4.700.989.002$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$1.870.585.220 / 3 = 623.528.406$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$33.333.333.333 - 4.700.989.002 = 28.632.344.331$	(2)		
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$4.700.989.002 - 623.528.406 = 4.077.460.596$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$28.632.344.331 - 4.077.460.596 = 24.554.883.735$	(4)		
Número total de términos sucesión A	33.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,85897033$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 28.632.344.331$	(2)	$k_{jx} \approx 0,857592499$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,99839595$
Primos mayores que 10^6	$\approx 4.700.989.002$	(1)	$c_{jx} \approx 2,058134681$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 28.632.344.331$	(2)	$k_{0x} \approx 0,835815434$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,973043427$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 24.554.883.735$	(4)	$k_{7x} \approx 0,835465384$	
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 4.077.460.596$	(3)	$k_{11x} \approx 0,844867362$	

 10^{13}

346.065.536.839 primos *

15.834.664.872 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{13} / 30 = 333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$346.065.536.839 / 8 = 43.258.192.105$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$15.834.664.872 / 3 = 5.278.221.624$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$333.333.333.333 - 43.258.192.105 = 290.075.141.228$	(2)		
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$43.258.192.105 - 5.278.221.624 = 37.979.970.481$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$290.075.141.228 - 37.979.970.481 = 252.095.170.747$	(4)		
Número total de términos sucesión A	333.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,870225423$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 290.075.141.228$	(2)	$k_{jx} \approx 0,869068509$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,998670559$
Primos mayores que $10^{6,5}$	$\approx 43.258.192.105$	(1)	$c_{jx} \approx 2,042626025$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 290.075.141.228$	(2)	$k_{0x} \approx 0,85087246$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,977760977$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 252.095.170.747$	(4)		
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 37.979.970.481$	(3)		

 10^{14}

3.204.941.750.802 primos *

135.780.321.665 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{14} / 30 = 3.333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$3.204.941.750.802 / 8 = 400.617.718.850$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$135.780.321.665 / 3 = 45.260.107.221$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$3.333.333.333.333 - 400.617.718.850 = 2.932.715.614.483$	(2)		
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$400.617.718.850 - 45.260.107.221 = 355.357.611.629$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$2.932.715.614.483 - 355.357.611.629 = 2.577.358.002.854$	(4)		
Número total de términos sucesión A	3.333.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,879814684$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 2.932.715.614.483$	(2)	$k_{jx} \approx 0,878829842$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,998880626$
Primos mayores que 10^7	$\approx 400.617.718.850$	(1)	$c_{jx} \approx 2,028807737$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 2.932.715.614.483$	(2)	$k_{0x} \approx 0,863397011$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,981339623$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 2.577.358.002.854$	(4)		
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 355.357.611.629$	(3)		

 10^{15}

29.844.570.422.669 primos *

1.177.209.242.304 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{15} / 30 = 33.333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$29.844.570.422.669 / 8 = 3.730.571.302.833$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$1.177.209.242.304 / 3 = 392.403.080.768$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$33.333.333.333.333 - 3.730.571.302.833 = 29.602.762.030.500$	(2)		
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$3.730.571.302.833 - 392.403.080.768 = 3.338.168.221.065$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$29.602.762.030.500 - 3.338.168.221.065 = 26.264.593.809.435$	(4)		
Número total de términos sucesión A	33.333.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,888082861$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 29.602.762.030.500$	(2)	$k_{jx} \approx 0,887234568$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,999044804$
Primos mayores que $10^{7,5}$	$\approx 3.730.571.302.833$	(1)	$c_{jx} \approx 2,016482789$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 29.602.762.030.500$	(2)	$k_{0x} \approx 0,873978945$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,984118693$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 26.264.593.809.435$	(4)		
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 3.338.168.221.065$	(3)		

10^{16}

279.238.341.033.925 primos *

10.304.195.697.298 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{16} / 30 = 333.333.333.333.333$
 Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $279.238.341.033.925 / 8 = 34.904.792.629.240$ (1)
 Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $10.304.195.697.298 / 3 = 3.434.731.897.432$
 Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$ $333.333.333.333.333 - 34.904.792.629.240 = 298.428.540.704.093$ (2)
 Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$
 Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ $34.904.792.629.240 - 3.434.731.897.432 = 31.470.060.721.808$ (3)
 Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ $298.428.540.704.093 - 31.470.060.721.808 = 266.958.479.982.285$ (4)

Número total de términos sucesión A	333.333.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,895285622$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 298.428.540.704.093$	(2)	$k_{jx} \approx 0,894547415$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,999175451$
Primos mayores que 10^8	$\approx 34.904.792.629.240$	(1)	$c_{jx} \approx 2,005561339$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 298.428.540.704.093$	(2)	$k_{0x} \approx 0,883038021$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,986319895$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 266.958.479.982.285$	(4)	$k_{7x} \approx 0,877833225$	
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 31.470.060.721.808$	(3)	$k_{11x} \approx 0,884814184$	
			$k_{13x} \approx 0,886559424$	

 10^{18}

24.739.954.287.740.860 primos *

808.675.888.577.436 parejas de primos gemelos *

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{18} / 30 = 33.333.333.333.333.333$
 Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $24.739.954.287.740.860 / 8 = 3.092.494.285.967.607$ (1)
 Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $808.675.888.577.436 / 3 = 269.558.629.525.812$
 Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$ $33.333.333.333.333.333 - 3.092.494.285.967.607 = 30.240.839.047.365.726$ (2)
 Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$
 Número aproximado de primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ $3.092.494.285.967.607 - 269.558.629.525.812 = 2.822.935.656.441.795$ (3)
 Número aproximado de múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$ $30.240.839.047.365.726 - 2.822.935.656.441.795 = 27.417.903.390.923.931$ (4)

Número total de términos sucesión B	33.333.333.333.333.333		$k_{ax} \approx 0,907225171$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 30.240.839.047.365.726$	(2)	$k_{jx} \approx 0,906651543$	$k_{jx} / k_{ax} \approx 0,999367712$
Primos mayores que 10^9	$\approx 3.092.494.285.967.607$	(1)	$c_{jx} \approx 1,987076711$	
Número de términos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 30.240.839.047.365.726$	(2)	$k_{0x} \approx 0,897737814$	$k_{0x} / k_{ax} \approx 0,989542445$
Múltiplos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 27.417.903.390.923.931$	(4)	$k_{7x} \approx 0,8917627$	
Primos $(7m - 2), (11m - 2), \dots$	$\approx 2.822.935.656.441.795$	(3)	$k_{11x} \approx 0,897947688$	
			$k_{13x} \approx 0,899493935$	

Bibliografía

- [1] [Teorema de Dirichlet](#). Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [2] [Teorema de los números primos para progresiones aritméticas](#). Wikipedia e información sobre este teorema en Internet.
- [3] [Teorema de los números primos](#). Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [4] [Conjetura de los Primos Gemelos](#). Páginas especializadas de Internet.
- [5] [Conjetura de Hardy-Littlewood](#). Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.
- [6] [Conjetura de Goldbach](#). Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.
- [7] [Conjetura de Polignac](#). Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.

Autor: Ramón Ruiz
 Barcelona, España
 Mail: ramonruiz1742@gmail.com