

# **A deflexão da luz pelo Sol. A solução assintótica (The deflection of light by the Sun. The asymptotic solution)**

Valdir Monteiro dos Santos Godoi

[valdir.msgodoi@gmail.com](mailto:valdir.msgodoi@gmail.com)

**RESUMO** – Calculamos o ângulo da deflexão sofrida pela luz ao passar nas proximidades de uma grande massa  $M$ , o Sol, utilizando o comportamento assintótico da solução exata da equação do movimento da luz segundo a Relatividade Geral (espaço-tempo de Schwarzschild). O ângulo obtido é praticamente constante, de cerca de  $65^{\circ},4$ , menos a deflexão obtida com a mecânica newtoniana.

**ABSTRACT** – We calculate the angle of the deflection suffered by the light passing near a large mass  $M$ , the Sun, using the asymptotic behavior of exact solution of the equation for the light movement according to the General Relativity (Schwarzschild space-time). The resulting angle is practically constant of about  $65^{\circ},4$ , minus the deflection obtained with Newtonian mechanics.

**Palavras chave:** deflexão, luz, Sol, relatividade geral, solução aproximada, solução assintótica, espaço-tempo de Schwarzschild.

**Keywords:** deflection, light, Sun, general relativity, approximate solution, asymptotic solution, Schwarzschild's space-time.

## **1. Introdução**

Mostramos em [1] que a Relatividade Geral obtém para o movimento da luz sob influência gravitacional de uma massa  $M$  uma solução que leva à colisão da luz com esta massa, o que não acontece com a Mecânica Newtoniana.

Esta colisão ocorre devido ao fato de que a solução encontrada para a equação do movimento foi calculada apenas de maneira aproximada, em 2ª ordem, pelo método das perturbações. Não deveria haver colisão com uma solução exata, por imposição de condição de contorno apropriada.

Vejamos então o que ocorre sem usarmos o método das perturbações. Buscaremos o comportamento no infinito da solução exata que pode ser obtida com a Relatividade Geral, mas antes relembremos a solução aproximada.

Segundo [2], a equação do movimento para partículas-teste no espaço-tempo de Schwarzschild<sup>[3]</sup> é

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{c^2\varepsilon^2 - b}{l^2} + \frac{2mb}{l^2}u + 2mu^3, \quad (1)$$

para  $u = 1/r$ ,  $\varepsilon$  e  $l$  constantes do movimento e  $m = GM/c^2$ , com os habituais significados de  $r$ ,  $G$ ,  $c$ .

Para partículas-teste com massa usamos  $b = c^2$ , e para partículas não massivas usamos  $b = 0$ . Então no caso do movimento da luz, considerando que o fóton não possua massa, (1) fica igual a

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{c^2\varepsilon^2}{l^2} + 2mu^3, \quad (2)$$

que se transforma em

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = 3mu^2 \quad (3)$$

ao derivar os dois membros de (2) em relação a  $\varphi$ .

A solução aproximada de (3), pelo método das perturbações, até segunda ordem, é

$$u = \frac{1}{R_0} \cos\varphi + \frac{m}{R_0^2} (1 + \sin^2\varphi), \quad (4)$$

onde  $R_0$  representa a distância de máxima aproximação da partícula com respeito à origem, em  $\varphi = 0$ . Embora ela forneça o ângulo de deflexão da luz considerado correto (a partir de  $r \rightarrow \infty$ ,  $u \rightarrow 0$ ),

$$D = \frac{4m}{R_0} = \frac{4GM}{c^2 R_0} \approx 1'', 75, \quad (5)$$

para  $R_0 = R_S$  o raio do Sol ( $6,960 \times 10^8$  m), ela traz o inconveniente de que em  $\varphi = 0$  não temos o esperado valor  $r = R_0$ , e sim

$$r(\varphi = 0) = \frac{1}{u(\varphi=0)} = R_0 \frac{1}{1 + \frac{m}{R_0}} < R_0, \quad (6)$$

ou seja, o fóton, nesta aproximação, avança pelo interior do Sol, significando obviamente que houve uma colisão anterior em sua superfície.

A título de comparação, o deslocamento interior obtido em (6), para o raio do Sol  $R_0 = 6,960 \times 10^8$  m e a razão  $m/R_0$  da ordem de  $2 \times 10^{-6}$ , é próximo de  $1,4 \times 10^3$  m, que em virtude da grandeza do raio do Sol corresponde a uma região muito além de um volume molecular, por exemplo.

O ângulo de colisão  $\varphi$  pode ser obtido igualando (4) a  $1/R_0$ , ou seja,

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_0} \cos\varphi + \frac{m}{R_0^2} (1 + \sin^2\varphi), \quad (7)$$

e então

$$\frac{m}{R_0} \cos^2\varphi - \cos\varphi + \left(1 - 2\frac{m}{R_0}\right) = 0, \quad (8)$$

cujas soluções matematicamente aceitáveis ( $-1 \leq \cos\varphi \leq +1$ ) é

$$\cos\varphi = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\frac{m}{R_0}(1 - 2\frac{m}{R_0})}}{2\frac{m}{R_0}}. \quad (9)$$

Está claro que  $\varphi = 0$  não é solução de (9), nem de (8), qualquer que seja o valor de  $m/R_0$ . Como  $m/R_0$  é pequeno comparado com 1, da ordem de  $2 \times 10^{-6}$ , podemos aproximar (9) para

$$\cos\varphi \approx 1 - 2\frac{m}{R_0}, \quad (10)$$

que para ângulos  $\varphi$  também pequenos fornece

$$\varphi \approx 2\sqrt{\frac{m}{R_0}}, \quad (11)$$

um ângulo muito pequeno, a raiz quadrada do ângulo obtido em (5) para a deflexão da luz, mas que não é nulo. Se um fóton emitido por uma estrela distante tivesse um movimento que obedecesse à solução (4) para as equações (3) ou (2), este fóton acabaria por colidir com o Sol, seria absorvido, e não chegaria à Terra. Se todos os fótons emitidos pela estrela que viessem em nossa direção tivessem esta mesma trajetória claro que a estrela se tornaria invisível para nós. Estamos evidentemente desprezando todos os mais complicados efeitos envolvendo Eletromagnetismo, Termodinâmica e Mecânica Quântica.

## 2 – A solução assintótica

Em [1] mencionamos que “Se esta mesma solução que prediz o desvio de  $1''$ ,75 para o ângulo de deflexão da luz também leva antes à colisão da luz, parece claro que *a priori* ela não pode ser adotada para o cálculo desta deflexão, despreocupadamente, sem maior análise. Precisamos de melhor solução, e que não leve a nenhuma previsão indesejável.” É o que faremos agora. O termo  $\frac{c^2 \varepsilon^2}{l^2}$  que aparece em (2), mas não em (3), terá importância fundamental.

Continuaremos a usar a equação do movimento obtida com a solução exata de Schwarzschild para as equações de campo de Einstein, que constitui uma solução para o tensor métrico  $g_{\mu\nu}$ , representando um campo gravitacional estático e esfericamente simétrico, como é esperado que ocorra no caso de sistemas planetários como o sistema solar, na região exterior a uma distribuição de massa com simetria esférica.<sup>[2]</sup>

Partiremos da equação (2),

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{c^2 \varepsilon^2}{l^2} + 2mu^3, \quad (12)$$

mas não precisaremos obter a solução exata  $u(\varphi)$  para todo ângulo  $\varphi$ . Vimos na Introdução e em [1], conforme [2], que podemos obter o ângulo de deflexão da luz na presença de uma grande massa  $M$  através do limite que a solução da equação do movimento tem no infinito, i.e.,  $r \rightarrow \infty$  ou  $u \rightarrow 0$ , obtendo-se então o ângulo  $\varphi$  correspondente a este limite e o ângulo que as assíntotas da trajetória formam com o eixo  $Y$ , que é igual ao ângulo complementar de  $\varphi$ , em módulo. Sendo assim, o que principalmente nos interessará será a obtenção da solução assintótica da equação do movimento (12), a equação da reta assíntota da trajetória da luz, ou a equação da reta tangente à solução (12) próxima da origem.

Com temos a equação na incógnita  $u = 1/r$ , o infinito espacial  $r \rightarrow \infty$  neste caso corresponderá ao zero  $u \rightarrow 0_+$ . O símbolo  $0_+$  que adotaremos na sequência é para nos lembrarmos de que valores de  $u$  (e  $r$ ) negativos não terão significado físico.

Para  $u \rightarrow 0_+$  a equação (12) se reduz a

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{c^2 \varepsilon^2}{l^2}, \quad (13)$$

ou

$$\frac{du}{d\varphi} = A, \quad (14)$$

para  $A = \pm \left| \frac{c\varepsilon}{l} \right|$ . Integrando (14) vem

$$u = A\varphi + B, \quad (15)$$

onde  $B$  é uma constante a determinar.

A solução exata  $u$  de (12) na vizinhança de  $u \rightarrow 0_+$  será então aproximadamente igual a (15), para um mesmo valor de  $\varphi$ . Particularmente em  $u \rightarrow 0_+$  elas devem ser iguais. Igualando (15) a zero obtemos

$$\varphi = -\frac{A}{B}. \quad (16)$$

Para outros valores de  $\varphi \neq -\frac{A}{B}$  a solução exata  $u(\varphi)$  de (12) e a reta (15) têm valores aproximadamente iguais na vizinhança de  $u \rightarrow 0_+$ , que é o comportamento que se espera de uma função e sua reta tangente em um determinado ponto, ou o desenvolvimento de uma função em primeira ordem de aproximação em torno deste ponto. Mais especificamente, em  $\varphi = 0$  os valores de ambas as funções devem ser iguais, por imposição de nossa condição de contorno

$$u(\varphi = 0) = \frac{1}{R_0}. \quad (17)$$

Fazendo então  $\varphi = 0$  em (15) e usando (17) vem

$$B = \frac{1}{R_0}, \quad (18)$$

que aplicado em (16) dá

$$\varphi = -R_0 A = \pm R_0 \left| \frac{c\varepsilon}{l} \right|, \quad (19)$$

onde  $c$  é a velocidade da luz no vácuo,  $l$  o momento angular por unidade de massa e  $\varepsilon$  uma constante a determinar, que no limite newtoniano corresponde à conservação da energia.

Este ângulo  $\varphi$  corresponde então ao ângulo que torna  $u$  infinitamente pequeno, ou a distância  $r$  do vetor posição  $(x, y)$  infinitamente grande, ou seja, o ângulo que uma das assíntotas da trajetória forma com o eixo X, e também leva a solução procurada obedecer à condição (17), ou  $r(\varphi = 0) = R_0$ .

Observa-se em (19) que de fato existem duas soluções para o ângulo  $\varphi$ , que são  $\varphi$  e seu negativo  $-\varphi$ , devido à simetria do movimento. O ângulo de deflexão total  $\beta$  será o mesmo, quer usássemos uma ou outra das soluções.

Para o cálculo de  $\varepsilon$  usaremos (12) em  $\varphi = 0$ . Como  $u = 1/r$  então

$$\frac{du}{d\varphi} = \frac{du}{dr} \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\varphi}. \quad (20)$$

Para  $\varphi = 0$  temos, por simetria,

$$\frac{dr}{d\varphi}(\varphi = 0) = 0, \quad (21)$$

ou seja,  $\varphi = 0$  é um ponto extremo de  $r(\varphi)$ , a distância mínima ao centro, e pela condição de contorno

$$u(\varphi = 0) = \frac{1}{R_0}, \quad (22)$$

obtemos de (20), para  $u = \frac{1}{R_0}, r = R_0$ ,

$$\frac{du}{d\varphi}(\varphi = 0) = 0, \quad (23)$$

e assim (12) em  $\varphi = 0$  fica igual a

$$\frac{1}{R_0^2} = \left(\frac{c\varepsilon}{l}\right)^2 + 2m \frac{1}{R_0^3}. \quad (24)$$

A constante de movimento  $l$  é igual a

$$l = r^2 \dot{\varphi}, \quad (25)$$

o momento angular por unidade de massa, que para  $\varphi = 0$ , onde vale  $r = r_{min} = R_0$ , igual ao ponto de menor aproximação com relação à origem, e

$$\dot{\varphi} = \dot{\varphi}_{max} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} |_{\varphi=0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y/R_0}{\Delta y/c} = \frac{c}{R_0}, \quad (26)$$

leva a

$$l = R_0^2 \frac{c}{R_0} = R_0 c. \quad (27)$$

Então aplicando (27) em (24) obtemos

$$\frac{1}{R_0^2} = \left(\frac{c\varepsilon}{R_0 c}\right)^2 + 2m \frac{1}{R_0^3}, \quad (28)$$

donde

$$1 = \varepsilon^2 + \frac{2m}{R_0}. \quad (29)$$

Isto dá para  $\varepsilon$  o valor de

$$\varepsilon = \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{R_0}}, \quad (30)$$

e assim o ângulo  $\varphi$  em  $u \rightarrow 0_+$ , dado em (19), fica igual a

$$\varphi|_{u \rightarrow 0_+} = \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{R_0}}. \quad (31)$$

Com estas soluções simétricas para  $\varphi$  podemos entender que, sem a presença da massa  $M$ , o fóton viria do “infinito” seguindo por uma reta  $R$ , sob um ângulo  $\varphi$  em relação à reta  $X$ , e permaneceria indefinidamente sob esta reta, até que alguma outra condição o afastasse da trajetória, por exemplo, fosse absorvido por algum corpo. Com a presença de  $M$  na origem do sistema de coordenadas  $XY$ , entretanto, a reta  $R$  assume o papel de uma das assíntotas do movimento, e o fóton após sua passagem na vizinhança de  $M$  tem um movimento que se aproxima da outra assíntota simétrica a  $R$ , que faz um ângulo  $-\varphi$  em relação ao eixo  $X$ .

O ângulo de deflexão total  $\beta$  é então

$$\beta = \pi - 2|\varphi| = \pi - 2\sqrt{1 - \frac{2m}{R_0}}. \quad (32)$$

Quando  $\frac{2m}{R_0}$  é pequeno comparado com 1 podemos aproximar o ângulo  $\beta$  por

$$\beta \approx \pi - 2 - \frac{2m}{R_0}. \quad (33)$$

O termo  $\frac{2m}{R_0}$  que aparece em (32) e (33) é o valor dado pela deflexão da luz na passagem pelo Sol segundo a mecânica newtoniana ( $0'',875$ ), a metade do valor adotado na Relatividade Geral ( $1'',75$ ), mas a maior contribuição para a deflexão  $\beta$  da luz é a constante  $\pi - 2$ , em radianos, que em graus equivale a cerca de  $65^\circ,4$ , valor completamente em desacordo com os resultados experimentais.

### 3. Conclusão

Na análise que fizemos da solução de Schwarzschild<sup>[3]</sup> em [4] concluímos que a Relatividade Geral não explica a precessão do periélio de Mercúrio, pois a solução obtida para a equação do movimento não pode ter infinitos pontos de máximos e mínimos, nem mesmo um número muito grande destes pontos extremos, que corresponderiam a um movimento do periélio (e afélio) a cada revolução completa, já que a equação do movimento envolve uma derivada de primeira ordem elevada ao quadrado de um lado e um polinômio de 3º grau do outro. Nos extremos de  $u$ , e conseqüentemente de  $1/r$ , chegamos a uma equação do 3º grau apenas, sem a esperada precessão a cada volta completa, o chamado avanço do periélio.

Em trabalho mais recente<sup>[5]</sup>, e mais importante, concluímos de novo que a Relatividade Geral não explica esta precessão, pois, ao contrário da informação conhecida, a Mecânica de Newton explica completamente o movimento de precessão do periélio de Mercúrio (e muito provavelmente dos outros planetas também, além

das outras anomalias já conhecidas). A Relatividade Geral era a responsável pela explicação da diferença entre a precessão observada ( $\Delta\varphi_{OBS}$ ) e a calculada com a Mecânica de Newton ( $\Delta\varphi_N$ ) até então, mas uma vez que a Mecânica de Newton é capaz de obter o valor da precessão do periélio igual ao observado (com valores atualizados dos elementos considerados fixos, além das massas dos planetas do sistema solar e seus respectivos satélites), o resultado da precessão calculado com a Relatividade Geral ( $\Delta\varphi$ ) deveria ser igual a zero, ao invés de 43'' por século, no caso de Mercúrio, conforme a equação (8.6.13) de Weinberg<sup>[6]</sup>:

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_{OBS} - \Delta\varphi_N. \quad (34)$$

Agora, no presente artigo, concluímos que a Relatividade Geral leva a um valor muito grande, cerca de 65°,4, praticamente independente da massa  $M$  e raio  $R_0$  do Sol, para o ângulo de deflexão da luz na passagem pelo Sol, e bem diferente do conhecido (1,75''), o que de certa forma já era prenunciado pelas conclusões anteriores, referentes à precessão do periélio de Mercúrio. Este é o valor obtido com a solução exata da Relatividade Geral para distâncias infinitamente grandes, mas leva a um valor bem diferente do resultado padrão conhecido, obtido pelo método de perturbações até segunda ordem. Há sim um sério problema com a Relatividade Geral, e resultados tão fartamente divulgados referentes aos cálculos obtidos com ela mostram-se incorretos quando calculados mais exatamente, sem as costumeiras aproximações de primeira e segunda ordens.

Sabemos que há outras maneiras de calcular a deflexão da luz na Relatividade Geral diferentes da que foi mencionada aqui (e na seção 3 de [1]), baseada em [2]. Dos autores mais consagrados talvez sejam Weinberg<sup>[6]</sup> e Landau & Lifschitz<sup>[7]</sup> os que mais diferem do método aqui apontado, e somos obrigados também a comentá-los, mesmo que uma análise mais completa caiba melhor em outro artigo. Lembramos ainda que também já fizemos uma crítica da dedução original de Einstein<sup>[8]</sup> deste ângulo de deflexão.

Weinberg<sup>[6]</sup> é rigoroso em várias passagens de seus cálculos, mas o resultado final baseia-se em uma integral elíptica (tal como em Landau<sup>[7]</sup>), que por sua vez envolve duas séries infinitas, para as funções que chama de  $A(r)$  e  $B(r)$ . A manipulação destas séries no integrando leva a uma terceira série infinita, e o resultado final, que dá o ângulo de deflexão esperado de 1'',75, é obtido com a primeira ordem em  $MG/r_0$  desta série. Trata-se de fato de uma complicada série numérica, mas apenas os seus "primeiros" termos são utilizados para o resultado final, desprezando-se assim infinitos termos. Pessoalmente não consigo acreditar que todo o restante da série, a parte que foi desprezada, convirja para o valor zero, o que merece uma análise maior do assunto.

Landau & Lifschitz<sup>[7]</sup> fazem uma sofisticada dedução do ângulo de deflexão da luz. É difícil seguir o raciocínio deles (acho que Lifschitz é o grande relativista da dupla),

mas  $M$ , o momento angular, ora é definido como constante, ora deriva-se em relação a ele. A ação  $S$  também é truncada, ou seja, em um desenvolvimento em série, função da distância  $r$ , despreza-se infinitos termos (esta omissão é bem mais oculta que a feita em Weinberg), sem esclarecimentos sobre as conseqüências desta aproximação. Eles chegam ao resultado conhecido, mas que sob uma melhor análise difere dos demais até aqui verificados: o ângulo de deflexão  $\delta\varphi$  depende da freqüência da luz,  $\omega_0 = -\partial\psi/\partial t$ , devido à substituição que fazem,  $Q = cM/\omega_0$ , e ao correspondente resultado obtido,  $\delta\varphi = \frac{4kmr}{c^2 Q}$ .  $\psi$  é a eikonal, a fase de uma onda luminosa, que deve ser uma quantidade grande (§ 53 da *Teoria do Campo*).

### Bibliografia

1. Godoi, V.M.S., *The Deflection of Light by the Sun. The Newtonian Calculation*, <http://www.vixra.org/abs/1412.0263> (2014).
2. Lorenci, V. de, *Teoria da Gravitação*, em *Programa Mínimo de Cosmologia*, cap. 1, org. Mario Novello et al. Rio de Janeiro: Jauá Editora (2010).
3. Schwarzschild, K., *On the Gravitational Field of a Point-Mass, According to Einstein's Theory*, em <http://zelmanov.ptep-online.com/papers/zj-2008-03.pdf>, do original "Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie", Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Phys.-Math. Klasse, 189-196 (1916).
4. Godoi, V.M.S., *The Exact Schwarzschild Solution*, <http://vixra.org/abs/1407.0005> (2014).
5. Godoi, V.M.S., *The Precession of the Perihelion of Mercury Explained by Celestial Mechanics of Laplace*, <http://vixra.org/abs/1410.0133> (2014).
6. Weinberg, S., *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*, pp. 188-190, 199. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1972).
7. Landau, L. e Lifschitz, E., *Teoria do Campo*, pp. 379-383. São Paulo: Hemus Livraria Editora Ltda. (1974).
8. Godoi, V.M.S., *The Deflection of Light by the Sun. The Einstein's Calculation in 1916*, <http://vixra.org/abs/1412.0141> (2014).